

**ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA IBU P.S
KEHAMILAN, BERSALIN, BBL, NIFAS DAN KB DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS SARULLA
KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN
TAPANULI UTARA
TAHUN 2020**



**OLEH :
CHRISNINA BR SEMBIRING
NPM. 171603**

**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
PROGRAM STUDI D-III KEBIDANAN TARUTUNG**

**Jl. Raja Toga Sitompul Kec. Siatas Barita
Telp. (0633) 7325855 Fax. (0633) 7325856
TAPANULI UTARA – Kode Pos 22417**

**ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA IBU P.S
KEHAMILAN, BERSALIN, BBL, NIFAS DAN KB DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS SARULLA
KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN
TAPANULI UTARA
TAHUN 2020**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MENYELESAIKAN
PENDIDIKAN AHLI MADYA KEBIDANAN PADA PROGRAM
STUDI DIII KEBIDANAN TARUTUNG POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES MEDAN**



**OLEH :
CHRISNINA BR SEMBIRING
NPM. 171603**

**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
PROGRAM STUDI D-III KEBIDANAN TARUTUNG
Jl. Raja Toga Sitompul Kec. Siatas Barita
Telp. (0633) 7325855 Fax. (0633) 7325856
TAPANULI UTARA – Kode Pos 22417**

VISI :

Menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang kompetitif dengan keunggulan penerapan hypnoterapi dalam asuhan kebidanan tahun 2025

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan secara komprehensif yang berbasis komprehensif yang berbasis kompetensi dalam upaya mempersiapkan bidan dengan keunggulan hypnoterapi dalam asuhan kebidanan
2. Melaksanakan penelitian oleh dosen dan mahasiswa khususnya dalam penerapan hypnoterapi dalam asuhan kebidanan
3. Melaksanakan pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam penerapan hypnoterapi pada asuhan kebidanan
4. Mengembangkan SDM dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni melalui kemitraan dengan lintas program dan lintas sektoral baik lokal, regional, nasional, dan internasional

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROPOSAL LAPORAN TUGAS AKHIR INI TELAH DI
SETUJUI UNTUK DI PERTAHANKAN PADA UJIAN
PROPOSAL LAPORAN TUGAS AKHIR**

TANGGAL 17 FEBRUARI 2020

OLEH :

CHRISNINA BR SEMBIRING

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dimpu R Nainggolan, SST, M.Kes
NIP.19781025 201101 2 003**

**Riance M Ujung, SST, M.K.M
NIP.19860829 201101 2 015**

**Mengetahui
Ka. Prodi D-III Kebidanan Tarutung
Poltekkes Kemenkes Medan**

**Marni Siregar, SST, M.Kes
NIP 19630904 1988602 2 001**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN TUGAS AKHIR INI TELAH DIPERTAHANKAN
UNTUK DI UJI DI DEPAN TIM PENGUJI PADA
SIDANG LAPORAN TUGAS AKHIR PRODI
D-III KEBIDANAN TARUTUNG**

PADA TANGGAL 14 APRIL 2020

MENGESAHKAN

TANDA TANGAN

Ketua Penguji : DIMPU R NAINGGOLAN, SST, M.Kes
Anggota I : EMILIA SILVANA SITOMPUL, SST, M.K.M
Anggota II : RIANCE M UJUNG, SST, M.K.M

**Mengetahui
KA PRODI DIII KEBIDANAN TARUTUNG
POLTEKKES KEMENKES MEDAN**

**Marni Siregar, SST, M.Kes
NIP 19630904 1988602 2 001**

NAMA : CHRISNINA BR SEMBIRING
NPM : 17.1603

**ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA IBU P.S KEHAMILAN,
BERSALIN, BBL, NIFAS DAN KB DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
SARULLA KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULI
UTARA TAHUN 2020**

RINGKASAN ASUHAN KEBIDANAN

AKI merupakan jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas, tetapi bukan seperti kecelakaan di setiap 100.000 kelahiran hidup. Ada pun target pencapaian SDGs dalam mengurangi rasio kematian ibu secara global hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Responden pada LTA ini adalah Ibu "P.S" usia kehamilan 34 minggu dengan standart 10T. Ibu "PS" dalam keadaan baik dan dalam batas normal, Kenaikan BB ibu 12 kg saat hamil. Pada tanggal 26 Februari 2020, Asuhan persalinan Ibu "M.S" berlangsung dengan baik dengan APN 60 langkah, bayi lahir berjenis kelamin perempuan, BBL 3300 gram, PB 50 cm segera dilakukan perawatan bayi baru lahir, dilakukan Inisiasi Menyusui Dini.

Kunjungan Neonatus dilakukan perawatan tali pusat dan tanda bahaya bayi baru lahir. Asuhan masa nifas sebanyak 3 kali dengan melakukan Perawatan Perineum, Tinggi Fundus dan Kontraksi uterus normal. Namun ibu memutuskan untuk menggunakan Metode Amenore Laktasi (MAL).

Berdasarkan hasil yang dilakukan penulis tidak menemukan masalah ketika melakukan pelaksanaan terhadap pasien. Asuhan komprehensif ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan khususnya bidan pada setiap kliennya sehingga kondisi ibu dan bayi tetap baik dan dapat mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.

**Kata Kunci : Asuhan Kebidanan Komprehensif Kehamilan,
Bersalin, Nifas sampai BBL**

Daftar Pustaka : 14 (2007-2017)

**MEDAN HEALTH POLYTECHNIC OF MINISTRY OF HEALTH
MIDWIFERY ASSOCIATE DEGREE PROGRAM OF TARUTUNG
FINAL PROJECT REPORT**

**CHRISNINA BR SEMBIRING
17.1603**

**COMPREHENSIVE MIDWIFERY CARE TO MRS.P.S FOR PREGNANCY,
CHILDBIRTH, NEWBORN, POSTPARTUM AND FAMILY PLANNING IN THE
WORKING AREA OF PUSKESMAS SARULLA, PAHAE JAE SUB DISTRICT,
NORTH TAPANULI DISTRICT, 2020**

SUMMARY OF MIDWIFERY CARE

MMR is the number of maternal deaths caused by pregnancy, childbirth, and postpartum, but not like accidents in every 100,000 live births. There is also a target for achieving the SDGs in reducing the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births.

Respondents in this final project report were Mrs.PS at 34 weeks of gestational age with a standard of *10T*. Mrs.PS was in good condition and within normal limits, the increase in mother's weight was 12 kg during pregnancy. On February 26th, 2020, the maternal care for Mrs.PS went well with a 60-step of Normal Delivery Care, the baby was female, 3300 gram, 50 cm and immediately carried out the care for the newborn, carried out early initiation of breastfeeding.

Neonate visits were carried out for umbilical cord care and newborn danger signs. Postpartum care for 3 times by performing perineal care, Fundus Height and normal uterine contractions. However, the mother decided to use the Lactation Amenorrhea Method (LAM).

Based on the results, the authors did not find any problems when carrying out the implementation on patients. This comprehensive care was expected to be implemented by all health workers, especially midwives for each client, so that the condition of the mother and baby was still good and can prevent complications and even death.

Keywords : Comprehensive Midwifery Care for Pregnancy, Maternity, Postpartum to Newborn

Reference : 14 (2007-2017)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu P.S Usia 31 Tahun dengan G4P3A0H2 Kehamilan, Bersalin, BBL, Nifas dan KB Di Wilayah Kerja Puskesmas Sarulla Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Program Study D-III Kebidanan Tarutung Poltekkes Kemenkes Medan.

Dalam hal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Ka.Prodi D-III Kebidanan Tarutung sebagai pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Prodi D-III Kebidanan Tarutung Poltekkes Kemenkes Medan.
2. Ka. UPT Puskesmas Sarulla beserta seluruh Bidan dan Staf/Pegawai yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk praktek di wilayah puskesmas Sarulla dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Dimpu Nainggolan SST, M.Kes, sebagai ketua penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun laporan tugas akhir Program Study D-III Kebidanan Tarutung Poltekkes Kemenkes Medan serta bimbingan dan arahan sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Riance Mardiana Ujung SST, M.K.M sebagai penguji II yang telah memberikan saran atau pun masukan kepada penulis sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Emilia Silvana Sitompul SST, M.K.M sebagai penguji I yang telah bersedia menguji saya dan memberikan masukan kepada penulis sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Prodi DIII Kebidanan Tarutung yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
7. Bidan Lenny Tobing, yang telah bersedia membantu dan memberikan kesempatan untuk melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
8. Ibu P.S dan keluarga responden atas kerja samanya yang baik untuk kelancaran proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
9. Terimakasih buat kedua orangtuaku, Ayahanda Bahagia Sembiring dan Ibunda tercinta Marta Selferida Simorangkir, yang telah memberikan dorongan, semangat, motivasi dan doa sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan pada waktunya.
10. Rekan seangkatan dan pihak-pihak yang terkait yang banyak membantu dalam memperlancar proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dan yang selalu memberi dukungan dan menemani dalam proses studi di Prodi D-III Kebidanan Tarutung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Laporan Tugas Akhir ini, baik dari segi penulisan, bahasa yang digunakan maupun pembahasan yang dikerjakan oleh penulis. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran dalam perbaikan Laporan Tugas Akhir ini kedepannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat dan perbuatan baik sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi semua pihak yang menggunakan.

Tarutung, April 2020
Penulis

Chrisnina BR Sembiring

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Persetujuan

Kata Pengantar	i
Abstrak.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Ruang Lingkup Asuhan.....	6
C. Tujuan.....	6
1. Tujuan Umum.....	6
2. Tujuan Khusus.....	6
D. Sasaran, Tempat dan Waktu Asuhan Kebidanan ...	6
1. Sasaran Asuhan	6
2. Tempat Asuhan	6
3. Waktu Asuhan	7
4. Manfaat Asuhan	7

BAB II TINJAUAN TEORI

A. KEHAMILAN	9
1. Konsep Dasar Kehamilan.....	9
a. Pengertian Kehamilan.....	9
b. Fisiologi Kehamilan	9
c. Kebutuhan Nutrisi.....	12
d. Ketidaknyamanan umum selama kehamilan dan Penanganannya.....	13 13
2. Asuhan Kehamilan	16
a. Pengertian Asuhan Kehamilan.....	16

b. Tujuan Asuhan Kehamilan	16
c. Kunjungan Masa Hamil	16
d. Tahap Pemeriksaan Obstetri.....	16
e. Asuhan Pemeriksaan Antenatal “10T”	17
f. Tanda-tanda Bahaya pada Kehamilan.....	20
B. PERSALINAN	22
1. Konsep Dasar Persalinan.....	22
a. Pengertian Persalinan.....	22
b. Fisiologi Persalinan	22
c. Tanda-tanda Persalinan	23
d. Mekanisme Persalinan.....	23
e. Tahap Persalinan	28
2. Asuhan Persalinan Normal.....	30
a. Pengertian Asuhan Persalinan.....	30
b. Lima Benang Merah.....	30
c. Asuhan Persalinan Normal.....	32
d. Partograf	41
C. NIFAS	45
1. Konsep Dasar Masa Nifas	45
a. Pengertian Nifas.....	45
b. Perubahan Fisiologi Nifas	45
c. Perubahan Adaptasi Psikologis.....	48
2. Asuhan pada Ibu Nifas	49
a. Pengertian Asuhan Masa Nifas.....	49
b. Perawatan ibu pada Masa Nifas	49
c. Kunjungan pada Masa Nifas	50
d. Kebutuhan Masa Nifas	51
e. Tanda Bahaya pada Masa Nifas	51
D. BAYI BARU LAHIR	53
1. Konsep Dasar Bayi Baru Lahir	53
a. Pengertian Bayi Baru Lahir	53

b. Ciri-ciri Bayi Normal	53
c. Perubahan Fisiologi Bayi Baru Lahir	54
2. Asuhan Bayi Baru Lahir	55
a. Tanda Bahaya Bayi Baru Lahir	57
b. Jadwal Pemberian Imunisasi.....	58
c. Kunjungan Bayi Baru Lahir	59
E. Keluarga Berencana	60
1. Konsep Dasar Keluarga Berencana	60
a. Pengertian Keluarga Berencana	60
b. Fisiologi Keluarga Berencana	61
c. Jenis-jenis Kontrasepsi	61
2. Asuhan Keluarga Berencana.....	66
a. Langkah-langkah Konseling KB (SATU TUJU)	66
BAB III TINJAUAN KASUS	67
A. Manajemen Asuhan Kebidanan	67
1. Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil	67
2. Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin.....	81
3. Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas	96
4. Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir	104
5. Asuhan Kebidanan pada Akseptor KB.....	110
BAB IV PEMBAHASAN	112
A. Kehamilan.....	112
B. Persalinan.....	115
C. Nifas	116
D. Bayi Baru Lahir	117
E. Keluarga Berencana	118
BAB V KESIMPULAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Waktu penyusunan proposal asuhan kebidanan	7
Tabel 2.1	Usia Kehamilan Berdasarkan Tinggi Fundus Uterus	18
Tabel 2.2	Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid	19
Tabel 2.3	Proses Involusi Uteri	46
Tabel 2.4	Kunjungan masa Nifas	50
Tabel 2.5	Penilaian APGAR skor	57
Tabel 2.6	Jadwal Pemberian Imunisasi	58
Tabel 2.7	Kunjungan Neonatus.....	59
Tabel 2.8	Jenis dan waktu untuk ber-KB	61
Tabel 3.1	Pemantauan kala IV Persalinan.....	95
Tabel 3.2	Penilaian APGAR SCORE.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota	2
Gambar 2.1 Engagement.....	24
Gambar 2.2 Penurunan	25
Gambar 2.3 Fleksi.....	25
Gambar 2.4 Putar Paksi Dalam	26
Gambar 2.5 Ekstensi	27
Gambar 2.6 Putar Paksi Luar.....	27
Gambar 2.7 Ekspulsi.....	28
Gambar 2.8 Halaman Depan Partograf	43
Gambar 2. 9 Halaman Belakang Partograf	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Turun Lapangan dari Kampus.....
Lampiran 2 Nama Mahasiswa sesuai Lahan Praktek
Lampiran 3 Surat Balasan dari Puskesmas
Lampiran 4 Lembar Konsultasi
Lampiran 5 Inform Consent
Lampiran 6 Partograf
Lampiran 7 Helen Varney
Lampiran 8 Laporan Persalinan
Lampiran 9 Pendokumentansian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, menyebutkan bahwa pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (Kemenkes RI, 2018: 89).

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini tidak hanya mampu menilai program kesehatan ibu, tetapi juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan anak, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas (Kemenkes RI, 2018: 89).


Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, namun tidak berhasil mencapai target MDGs yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (Kemenkes RI, 2018: 158).

Jumlah kematian ibu yang dilaporkan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 adalah 185 orang dengan distribusi kematian ibu hamil 38 orang, kematian ibu bersalin 79 orang dan kematian ibu masa nifas 55 orang. Kelompok umur yang berkontribusi pada jumlah kematian ibu yang tinggi adalah kelompok usia 20-34 tahun (Kemenkes RI, 2018: 89-90).

Berdasarkan data profil kesehatan Tapanuli Utara tahun 2017 tercatat jumlah kematian ibu melahirkan (dilaporkan) sebanyak 8 orang, terdiri dari

kematian ibu hamil sebanyak 3 orang, kematian ibu bersalin sebanyak 3 orang serta kematian ibu Nifas sebanyak 2 orang. Penyebab utama kematian ibu melahirkan adalah eklamsi 1 orang, Preeklamsi 1 orang, Post partum blues 1 orang, Penyakit jantung 1 orang dan Pendarahan 4 orang (Dinkes Taput, 2018: 24).

Gambar 1.1. Jumlah Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2018

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu tiga tertinggi ada di Kabupaten Deli Serdang (15 orang), Kabupaten Mandailing Natal (13 orang), dan Kabupaten Asahan (12 orang). Terdapat 2 kabupaten/kota yang melaporkan tidak ada kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas pada tahun 2018, yaitu Kota Sibolga dan Kabupaten Nias Utara (Kemenkes RI, 2018: 90).

Kematian ibu terbanyak diketahui disebabkan oleh akibat lain-lain yang tidak dirinci dan diketahui sebab pastinya (74 orang), kemudian akibat perdarahan (60 orang), akibat hipertensi (29 orang), akibat infeksi (9 orang), akibat gangguan sistem peredaran darah (8 orang), serta akibat gangguan metabolik (5 orang). Terlihat bahwa kesadaran ibu hamil di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 untuk imunisasi masa kehamilan masih rendah (42,53% saja). Berdasarkan laporan profil kesehatan kabupaten/kota jumlah kematian 3 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu mulai tahun 2016 sebanyak 239 kematian, turun menjadi 205 kematian pada tahun 2017 serta turun lagi menjadi 185 kematian di tahun 2018. Bila jumlah kematian ibu dikonversi ke angka kematian ibu, maka AKI di Sumatera Utara sebesar 62,87 per 100.000 KH. Namun ini belum menggambarkan angka yang sebenarnya, karena diprediksi masih banyak kematian ibu yang belum tercatat dan dilaporkan (Kemkes RI, 2018: 91).

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Selama tahun 2006 sampai tahun 2017 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 cenderung meningkat. Cakupan K1 dan K4 Kementerian Kesehatan tahun 2017 sebesar 76%, capaian tahun 2017 telah mencapai target (Kemkes RI, 2017: 112). Pada tahun 2017 cakupan pelayanan K4 ibu hamil sebesar 87,09%, belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebesar 95 % (Dinkes Sumut, 2017: 50). Cakupan kunjungan ibu hamil K1 di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2017 sebesar 80 % dan cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 79 % (Dinkes Taput, 2018: 27).

Pada tahun 2018, cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Utara mencapai 85,90%, sudah mencapai target yang sudah ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 85%. Menyajikan gambaran cakupan

persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 (Kemekes RI, 2018: 96).

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas seperti, (1) pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan imunisasi Tetanus bagi wanita usia subur dan ibu hamil, (3) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (4) pelayanan kesehatan ibu nifas, (5) Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), dan (6) pelayanan kontrasepsi/KB (Kemenkes RI, 2018).

AKB Sumatera Utara tahun 2017 menjadi sebesar 13,4/1.000 KH (Dinkes Sumut, 2017:28). AKB di Tapanuli Utara tahun 2017 berdasarkan pencatatan dan pelaporan Puskesmas dan jaringannya adalah sebesar 11/1.000 KH. Target capaian AKB Nasional adalah 24 per 1.000 KH tahun 2019 (Dinkes Taput, 2018: 25).

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Pelayanan dalam kunjungan antara lain meliputi konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi (Kemenkes RI, 2018).

Capaian KN1 Indonesia pada tahun 2017 sebesar 92,62% lebih tinggi dari tahun 2016 yaitu sebesar 91,14% (Kemenkes RI, 2017:128). Cakupan KN1 dan KN3 pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 yaitu masing-masing sebesar 95,21% dan 91,14%. Pada tahun 2017, 95,00% dan 89,62% (Dinkes Sumut, 2017:55). Cakupan KN1 di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2017 adalah 100% meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 adalah 99%. Sementara cakupan KN3 tahun 2017 adalah sebesar 100 % meningkat di bandingkan tahun 2016 sebesar 94% (Dinkes Taput, 2018: 30).

Penyebab kematian neonatal (0-28 hari) di Sumatera Utara adalah asfiksia (263 kasus), kasus lainnya (202 kasus), BBLR (sebanyak 193 kasus), kelainan bawaan (56 kasus), sepsis (20 kasus) dan tetanus neonatorum (4 kasus). Penyebab kematian balita (12-59 bln) adalah demam (21 kasus), lain-lain (56 kasus), diare (15 kasus), (4 kasus) pneumonia (Kemenkes, 2018: 111).

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Masa nifas dimulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Cakupan kunjungan nifas (KF3) di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2008 sebesar 17,9% menjadi 87,36% pada tahun 2017 (Kemenkes, 2018). Pada tahun 2017 rata-rata cakupan pelayanan ibu nifas di Provinsi Sumatera Utara adalah 85,22%, menurun dibandingkan pencapaian tahun 2016 dan tahun 2015 masing-masing 86,70% dan 87,36% (Dinkes Sumut, 2018). Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2017 adalah sebesar 72.99% (Dinkes Taput, 2018).

KB merupakan hal utama dalam upaya menurunkan angka kematian ibu di dunia termasuk juga di Indonesia. Tren penggunaan kontrasepsi pada wanita kawin sejak tahun 1991 sampai 2017, terlihat adanya peningkatan prevalensi kontrasepsi dari 50 persen pada tahun 1991 menjadi 64 persen pada tahun 2017. Menurut BKKBN, KB aktif di antara PUS tahun 2018 sebesar 63,27% (Kemenkes RI, 2018). Jika dilihat dari jenis alat/cara KB yang digunakan, penggunaan alat/cara KB dengan cara suntikan masih mendominasi pemakaian alat/cara KB di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu sebesar 38,94% kemudian diikuti penggunaan Sterilisasi wanita/ tubektomi/MOW yaitu sebesar 28,49%, Susuk sebesar 21,98%, IUD sebesar 5,32%, sterilisasi pria/vasektomi/MOP sebesar

2,04%, PIL KB sebesar 1,57%, pantang berkala/kalender sebesar 1,07% dan metode menyusui alami sebesar 0,60% (Dinkes Taput, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, kematian ibu dan bayi dapat diturunkan dengan cara memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif (berkelanjutan) dengan SOAP mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan KB yang ditujukan pada ibu P.S G4P3A0H2 usia kehamilan 34 minggu di Puskesmas Sarulla Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

B. Identifikasi Ruang Lingkup Asuhan

Ruang lingkup asuhan dengan kasus fisiologi yang diberikan secara berkelanjutan (Continuity care) pada ibu Hamil trimester III dengan melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Melaksanakan Asuhan Kebidanan Secara Komprehensif pada ibu masa hamil trimester III, masa bersalin, bayi baru lahir, masa nifas dan asuhan Keluarga Berencana (KB) yang didokumentasikan melalui manajemen asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP.

2. Tujuan Khusus

Memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif sesuai dengan peran dan tanggung jawab bidan sebagai pelaksana yang mampu memberikan asuhan berkelanjutan (*Continue Of Care*), yaitu:

- a. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil
- b. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin
- c. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu nifas
- d. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bayi baru lahir
- e. Melaksanakan asuhan kebidanan pada keluarga berencana

D. Sasaran, Tempat dan Waktu Asuhan Kebidanan

1. Sasaran

Sasaran asuhan kebidanan trimester III kepada ibu P.S G4P3A0H2 umur 31 tahun dengan HPHT tanggal 21-06-2019, Tafsiran Tanggal

E. Manfaat Asuhan Kebidanan

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan D-III Kebidanan, menambah pengalaman dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB dan penulis dapat menerapkan asuhan kebidanan yang tepat dan aman sesuai standar profesi bidan.

2. Bagi Institusi

Hasil penulisan studi kasus ini dapat sebagai evaluasi institusi untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan secara komprehensif, Sebagai referensi perpustakaan, sebagai sumber acuan dan kepustakaan bagi mahasiswa yang akan datang.

3. Bagi Lahan Praktik

Sebagai bahan acuan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu asuhan kebidanan dari teori-teori baru dalam rangka peningkatan pelayanan berkualitas sesuai dengan Standar Asuhan Kebidanan.

4. Bagi Klien

Diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan ilmu pengetahuan kesehatan ibu dan anak mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. KEHAMILAN

1. Konsep Dasar Kehamilan

a. Pengertian Kehamilan

Pengertian kehamilan dari beberapa literatur adalah sebagai berikut: Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di mana trimester pertama berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawirohardjo, 2016 : 213).

Kehamilan dibagi atas 3 triwulan (Trimester): (a) kehamilan triwulan I antara minggu 0-12 minggu, (b) kehamilan triwulan II antara minggu 12-28, dan (c) kehamilan triwulan III antara minggu 28-40 minggu (Moctar, 2013: 35).

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Prawirohardjo, 2016: 213).

b. Fisiologi kehamilan

Perubahan anatomi dan fisiologi pada perempuan hamil sebagian besar sudah terjadi segera setelah fertilisasi dan terus berlanjut selama kehamilan. Kebanyakan perubahan ini merupakan respon terhadap janin. Suatu hal yang menakjubkan adalah bahwa hampir semua perubahan ini akan kembali seperti keadaan sebelum hamil setelah proses persalinan dan menyusui selesai (Prawirohardjo, 2016: 174).

Trimester ketiga sering disebut periode penantian dengan penuh kewaspadaan ada perasaan was-was mengingat bayi dapat lahir kapanpun. Persiapan yang aktif terlihat dalam menanti kelahiran bayi dan menjadi orang tua sementara perhatian utama wanita terfokus pada bayi yang akan segera dilahirkan (Varney, 2008: 503)

1) Perubahan pada Uterus

Rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol atau beratnya 30 gr akan mengalami *hipertropi dan hyperplasia*, sehingga menjadi seberat 1000 gr saat akhir kehamilan. Otot rahim mengalami hiperplasi dan hipertropi menjadi lebih besar, lunak, dan dapat mengikuti pembesaran rahim karena pertumbuhan rahim. Regangnya dinding rahim karena besarnya pertumbuhan dan perkembangan janin menyebabkan isthmus uteri semakin tertarik keatas dan menipis di Segmen Bawah Rahim. Perubahan konsentrasi hormonal yang mempengaruhi rahim yaitu estrogen dan progesterone mengalami penurunan dan menimbulkan kontraksi rahim yang disebut Braxton Hicks (Manuaba, 2017: 106).

2) Perubahan pada Serviks

Serviks merupakan organ yang kompleks yang mengalami perubahan yang luar biasa selama kehamilan dan persalinan karena bertanggung jawab menjaga janin di dalam uterus sampai akhir kehamilan. Satu bulan setelah konsepsi serviks akan menjadi lunak dan kebiruan (Prawirohardjo, 2016: 177).

3) Perubahan pada Vagina

Vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah karena pengaruh estrogen sehingga tampak berwarna merah dan kebiru-biruan (Tanda Chadwicks) (Cunningham, 2017: 116).

4) Perubahan pada Payudara

Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan payudara akan menjadi lebih lunak. Setelah bulan kedua payudara akan bertambah ukurannya dan vena-vena dibawah kulit akan lebih terlihat. Puting payudara akan lebih besar dan warna kehitaman tegak. Setelah bulan

pertama cairan berwarna kekuningan yang disebut kolostrum sudah dapat dikeluarkan selama trimester ketiga (Prawirohardjo, 2016: 179).

5) Sistem Metabolik

Sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan janin dan plasenta yang tumbuh pesat, wanita hamil mengalami perubahan metabolik yang besar. Pada trimester ketiga, laju metabolik ibu meningkat 10 hingga 20 persen dibandingkan dengan keadaan tak hamil (Cunningham, 2017: 179). Selama kehamilan berat badan akan bertambah 12,5 kg pada trimester kedua dan ketiga pada perempuan dengan gizi baik dianjurkan menambah berat badan sebesar 0,4 kg, sementara pada perempuan dengan gizi kurang atau berlebih dianjurkan menambah berat badan perminggu masing-masing sebesar 0,3 kg dan 0,5 kg (Prawirohardjo, 2016: 180).

6) Sistem Kardiovaskuler

Peningkatan volume darah total dimulai pada awal trimester pertama yang kemudian meningkat pesat hingga pertengahan kehamilan dan kemudian melambat hingga menjelang minggu ke-32 perubahan ini disebabkan oleh peningkatan kadar estrogen dan progesteron, dan perubahan ini akan kembali normal setelah kehamilan berakhir (Varney, 2008: 498).

7) Sistem integumen

Perubahan keseimbangan hormon menyebabkan timbulnya beberapa perubahan dalam sistem integumen selama masa hamil. Perubahan yang umum terjadi seperti peningkatan ketebalan kulit dan lemak, hiperpigmentasi, dan percepat aktifitas kelenjar keringat. Pigmentasi timbul akibat peningkatan hormon hipopisis anterior melanotropin selama masa hamil. Malasma diwajah disebut dengan cloasma dialami 50% sampai 70% wanita hamil, dimulai setelah minggu ke-16 dan meningkat secara bertahap sampai bayi lahir (Bobak, 2005: 117).

8) Sistem Pernafasan

Frekuensi pernapasan hanya mengalami sedikit perubahan selama kehamilan. Perubahan ini akan mencapai puncaknya pada minggu ke-37 dan akan kembali hampir seperti sedia kala dalam 24 minggu setelah persalinan (Prawirohardjo, 2016: 185).

9) Sistem Pencernaan

Pada sistem pencernaan, fungsi dari saluran cerna selama masa hamil menunjukkan gambaran yang sangat menarik. Nafsu makan meningkat, sekresi usus berkurang dan absorpsi nutrisi meningkat. Perubahan saluran cerna memungkinkan pengangkutan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin berada dibawah pengaruh hormon. (Bobak, 2005: 120)

10) Sistem endoktrin

Perubahan besar pada sistem endoktrin yang esensial terjadi untuk mempertahankan kehamilan, pertumbuhan normal janin, dan pemulihan pascapartum (Bobak, 2005: 121). Hormon prolaktin akan meningkat 10 kali lipat pada saat kehamilan aterm. Sebaliknya persalinan konsentrasinya pada plasma akan menurun. hal ini juga ditemui pada ibu-ibu yang menyusui (Prawirohardjo, 2016: 186).

11) Sistem saluran kemih (traktus urinarius)

Pada bulan pertama kehamilan kandung kemih akan tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan sering berkemih. Pada akhir kehamilan, jika kepala janin sudah mulai turun ke pintu atas panggul, keluhan ini akan timbul kembali (Prawirohardjo, 2016: 185).

c. Kebutuhan Nutrisi pada ibu hamil

Adapun kebutuhan nutrisi pada ibu hamil adalah sebagai berikut :

1) Kalori

Jumlah kalori yang dibutuhkan pada ibu hamil untuk setiap harinya adalah 2.500 kalori. Pengetahuan tentang berbagai jenis makanan yang dapat memberikan kecukupan kalori tersebut sebaiknya dapat dijelaskan secara rinci dan bahasa yang dimengerti oleh para ibu hamil dan

keluarganya. Jumlah kalori yang berlebih dapat menyebabkan obesitas dan hal ini merupakan faktor presdiposisi untuk terjadinya preeklampsia. Jumlah penambahan berat badan sebaiknya tidak melebihi 10-12 kg selama hamil.

2) Protein

Jumlah protein yang dibutuhkan ibu hamil adalah 85 gram per hari. Sumber protein tersebut dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan (kacang-kacangan) atau hewani (ikan, ayam, keju, susu, telur). Defisiensi protein dapat menyebabkan kelahiran premature, anemia dan edema.

3) Kalsium

Kebutuhan kalsium untuk ibu hamil adalah 1,5 gram per hari. Kalsium dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, terutama bagi pengembangan otot dan rangka. Contohnya : 2 gelas susu diminum setiap hari, 1 buah jeruk.

4) Zat Besi

Ibu hamil memerlukan kecukupan oksigenasi jaringan yang diperoleh dari pengikatan dan pengantaran oksigen melalui hemoglobin di dalam sel-sel darah merah. Untuk menjaga konsentrasi hemoglobin yang normal, diperlukan asupan zat besi bagi ibu hamil dengan jumlah 30 mg/hari terutama setelah trimester kedua.

5) Asam Folat

Selain zat besi, sel-sel darah merah juga memerlukan asam folat bagi pematangan sel. Jumlah asam folat yang dibutuhkan oleh ibu hamil adalah 400 mikrogram per hari. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik pada ibu hamil (Prawirohardjo, 2016: 286).

d. Ketidaknyamanan umum selama kehamilan dan penanganannya

Tidak semua wanita mengalami semua ketidaknyamanan yang umum muncul selama kehamilan, tetapi banyak wanita yang mengalaminya dengan ringan berat. Bebasnya seorang dari ketidaknyamanan tersebut dapat membuat perbedaan signifikan terhadap cara wanita memandang kehamilannya. Cara mengatasi ketidaknyamanan ini didasarkan pada

gejala yang muncul. Tidak semua cara tersebut cocok untuk semua wanita (Varney, 2008: 536).

1) Peningkatan frekuensi berkemih (nonpatologis)

Peningkatan frekuensi berkemih sebagai ketidaknyamanan nonpatologis yang berbeda selama periode antepartum. Satu-satunya metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi frekuensi berkemih ini adalah menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan mengurangi asupan cairan sebelum tidur malam sehingga wanita tidak perlu bolak balik ke kamar mandi pada saat mencoba tidur (Varney, 2008: 538).

2) Nyeri ulu hati

Nyeri ulu hati, ketidaknyamanan yang mulai timbul menjelang akhir trimester kedua dan bertahan hingga trimester ketiga. Isi lambung bersifat asam hidroklorida yang terdapat di dalam lambung.

Cara mengurangi nyeri ulu hati adalah:

- a) Makan dalam porsi sedikit tetapi sering untuk menghindari lambung untuk menjadi terlalu penuh.
- b) Pertahankan postur tubuh yang baik supaya ada ruang lebih besar bagi lambung untuk menjalankan fungsinya, postur tubuh membungkuk hanya menambah masalah karena posisi ini menekan tekanan dan lambung
- c) Regangkan lengan atas melampui kepala untuk memberi ruang bagi perut berfungsi
- d) Usahakan minum susu murni daripada susu manis.
- e) Hindari makanan yang dingin (Varney, 2008: 539).

3) Konstipasi

Konstipasi diduga terjadi akibat penurunan peristaltic yang disebabkan relaksasi otot polos pada usus besar ketika terjadi peningkatan jumlah progesterone.

Cara mengatasi konstipasi yaitu:

- a) Asupan cairan yang adekuat, yakni minum air mineral 8 gelas per hari dan istirahat yang cukup.

b) Minum air hangat saat bangkit dari tempat tidur untuk menstimulasi peristaltik (Varney, 2008: 539).

4) Nyeri punggung

Nyeri punggung hingga tahap tertentu dilaporkan pada hampir 70% wanita hamil (wang,dkk. 2004). Kelelahan, membungkuk berlebihan mengangkat beban, atau berjalan dapat menyebabkan nyeri punggung ringan. Nyeri punggung dapat dikurangi dengan menganjurkan wanita yang bersangkutan berjongkok dan bukan membungkuk ketika mengambil sesuatu dibawah, memberi bantalan penyangga di punggung ketika duduk, dan menghindari sepatu berhak tinggi. (Cunningham, 2017: 220)

Nyeri punggung bawah merupakan nyeri punggung yang terjadi pada area lumboakral. Nyeri punggung bawah biasanya akan meningkat intensitasnya seiring bertambahnya usia kehamilan karena nyeri ini merupakan akibat pergeseran pusat gravitasi wanita tersebut dan postur tubuhnya. Nyeri punggung juga dapat merupakan akibat membungkuk berlebihan, berjalan tanpa istirahat, dan angkat beban terutama bila salah satu atau semua kegiatan ini dilakukan saat wanita tersebut sedang lelah. Pada wanita primigravida biasanya memiliki otot abdomen yang sangat baik karena otot-otot tersebut belum pernah mengalami peregangan sebelumnya dan keparahan nyeri punggung bagian bawah biasanya meningkat seiring paritas (Varney, 2008: 542).

5) Tidur dan Rasa lelah

Dimulai pada awal kehamilan, banyak wanita mengalami kelelahan dan memerlukan lebih banyak tidur. Rasa lelah dan tidur yang tidak lelap dapat diperparah oleh *morning sickness*. Pada akhir trimester kedua, durasi tidur malam total berkurang, dan wanita yang bersangkutan biasanya mulai mengeluh gangguan tidur. Pada trimester ketiga, hampir semua wanita mengalami gangguan tidur. Meskipun waktu tidur malam total serupa dengan keadaan sebelum hamil namun efisiensi tidur terganggu (Cunningham, 2017: 221)

2. Asuhan Kehamilan

a. Pengertian Asuhan Kehamilan

Asuhan kehamilan adalah upaya preventif program pelayanan kesehatan obstetrik untuk optimalisasi luaran maternal dan neonatal melalui serangkaian kegiatan pemantauan rutin selama kehamilan (Prawirohardjo, 2016: 278).

b. Tujuan asuhan kehamilan

Ada 6 tujuan penting dalam memberikan asuhan antenatal, yaitu:

- 1) Membangun rasa percaya antara klien dengan petugas kesehatan
- 2) Mengupayakan terwujudnya kondisi terbaik bagi ibu dan bayi yang dikandungnya
- 3) Memperoleh informasi dasar tentang kesehatan ibu dan kehamilannya
- 4) Mengidentifikasi dan manatalaksana kehamilan resiko tinggi
- 5) Memberikan pendidikan kesehatan yang diperlukan dalam menjaga kualitas kehamilan dan merawat bayi. Menghindarkan gangguan kesehatan selama kehamilan yang akan membahayakan keselamatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya (Prawihardjo, 2016: 278).

c. Kunjungan Masa Hamil (Kemenkes RI, BPPSDM 2015: N-2)

Setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya empat kali kunjungan selama periode antenatal yaitu :

- 1) Satu kali kunjungan selama trimester pertama (sebelum 14 minggu)
- 2) Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-28)
- 3) Dua kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28-36 dan sesudah minggu ke 36)

d. Tahap Pemeriksaan Obstetri

1) Pemeriksaan khusus obstetrik :

a) Inspeksi :

1. Bentuk dan ukuran abdomen
2. Perut bekas operasi
3. Gerakan janin
4. Varises atau pelebaran vena

5. Hernia dan Edema

b) Palpasi :

1. Tinggi fundus
2. Punggung bayi
3. Presentasi
4. Sejauh mana bagian terbawah bayi masuk PAP.

c) Auskultasi :

1. Bising usus
2. Denyut Jantung Janin dan hal lain yang terdengar

d) Perkusi :

1. Ketuk pinggang
2. Reflek patela

e) Laboratorium :

1. HB dan Urine (Manuaba, 2017: 132).

e. Asuhan pemeriksaan antenatal “10 T”

Adapun standar pada asuhan minimal 10 T adalah sebagai berikut :

1) Pengukuran berat badan (BB)

Berat badan ibu hamil harus diperiksa pada tiap kali kunjungan. Sejak bulan ke-4, penambahan BB minimal 1 kg/bulan dan maksimal 2 kg/bulan

2) Ukur tinggi badan (TB)

Tinggi badan diperiksa hanya pada kunjungan pertama (K1) untuk mengetahui adanya faktor resiko pada ibu hamil. Bila tinggi badan < 145 cm maka ibu hamil mempunyai faktor risiko untuk panggu sempit

3) Ukur lingkar lengan atas (LiLA)

Lingkar lengan atas (LiLA) diukur hanya pada saat kunjungan pertama (K1). Pengukuran ini untuk menentukan status gizi ibu hamil. LiLA ibu hamil < 23,5 cm menunjukkan bahwa ibu hamil menderita kurang energi kronis

4) Ukur tekanan darah (TD)

Pengukuran dilakukan pada tiap kali kunjungan. TD normal jika sistole 120 mmHg dan diastole 80 mmHg. TD tinggi, bila TD sistole > 140 mmHg atau diastole > 90 mmHg, dimana merupakan faktor resiko untuk hipertensi dalam kehamilan

5) Ukur tinggi fundus uteri

Tinggi fundus uteri harus diukur tiap kali kunjungan sejak kehamilan berusia 4 bulan; penambahan tinggi fundus harus sesuai dengan kehamilan; bila tidak sesuai lakukan tes laboratorium yang dibutuhkan.

Tabel 2.1 Usia Kehamilan Berdasarkan Tinggi Fundus Uterus

Usia Kehamilan	Tinggi Fundus	
	Dalam cm	Menggunakan jari tangan
12 minggu	6-7 cm	3 jari diatas simfisis pubis
16 minggu	12 cm	Pertengahan simfisis dengan pusat
20 minggu	16 cm	2 jari dibawah pusat
24 minggu	20 cm	Setinggi pusat
28 minggu	25 cm	3 jari diatas pusat
32 minggu	28 cm	Pertengahan pusat dengan prosesus xifoideus
36 minggu	32 cm	Setinggi prosesus xifoideus
40 minggu	36 cm	2 jari dibawah prosesus xifoideus

Sumber : Cuningham, 2017 : 327

6) Tes laboratorium

Tes laboratorium yang wajib dilakukan bagi ibu hamil adalah tes hemoglobin darah (Hb) untuk mengetahui apakah ibu menderita anemia dan golongan darah untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan sama.

7) Berikan tablet tambah darah

Tablet tambah darah diberikan minimal sebanyak 90 tablet selama kehamilan kehamilan yang berguna untuk mencegah kekurangan darah selama kehamilan.

8) Pemberian imunisasi tetanus toxoid (TT)

Sebelum imunisasi diberikan sebaiknya sebelum dilakukan skrining status imunisasi tetanus toxoid ibu hamil dan berikan imunisasi sesuai status imunisasi tersebut. Jika ibu hamil tidak dalam status terlindungi, maka harus diberikan.

Interval pemberian imunisasi TT dan lama masa perlindungan yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pemberian Imunisasi *Tetanus Toxoid*

Imunisasi TT	Selang Waktu Minimal	Lama Perlindungan
TT1		Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus
TT2	1 bulan setelah TT1	3 tahun
TT3	6 bulan setelah TT2	5 tahun
TT4	12 bulan setelah TT3	10 tahun
TT5	12 bulan setelah TT4	>25 tahun

Sumber : (Kemenkes RI, Buku KIA, 2018: 02)

9) Tatalaksana kasus

Apabila dari pemeriksaan ditemukan faktor risiko segera dilakukan rujukan

10) Temu wicara/konseling

Tatap muka antara bidan dengan ibu hamil dalam rangka melakukan konseling dari mulai hamil sampai dengan perencanaan persalinan

dan pencegahan komplikasi serta KB pasca persalinan (Kemenkes RI, Buku KIA, 2018: 01).

f. Tanda-tanda Bahaya pada Kehamilan

Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan, yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu.

1) Perdarahan pervaginam

Perdarahan yang tidak normal adalah merah, perdarahan yang banyak, atau perdarahan dengan nyeri. Perdarahan ini dapat berarti Abortus, Kehamilan Mola atau Kehamilan Ektopik. Pada kehamilan lanjut, perdarahan yang tidak normal adalah merah (bisa segar atau tidak), banyak dan kadang-kadang, tidak selalu disertai rasa nyeri. Perdarahan semacam ini bisa berarti Plasenta Previa atau abrupsi plasenta.

2) Plasenta Previa

Plasenta Previa adalah plasenta yang abnormal, yaitu pada segmen bawah rahim, sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh *ostium uteri internum* (OUI). Angka kejadiannya sekitar 3-6 dari 1000 kehamilan.

3) Solusio Plasenta

Solusio plasenta atau abruption plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal pada uterus sebelum janin dilahirkan. Penyebabnya bisa karena perubahan anatomis/tumor pada rahim, karena tali plasenta pendek sehingga tertarik oleh gerakan janin.

4) Sakit kepala yang hebat

Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang dengan sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin menemukan bahwa penglihatannya menjadi kabur dan berbayang. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari pre-eklamsia.

5) Bengkak pada muka dan tangan

Bengkakan atau terasa berat akibat cairan (edema) pada tangan, muka dan sekitar mata atau penambahan berat badan yang tiba-tiba

sekitar 1 kilo atau lebih, yang tidak berkaitan dengan pola makan. Edema adalah penimbunan cairan secara umum dan berlebihan dalam jaringan tubuh, dan biasanya dapat diketahui dari kenaikan berat badan serta pembengkakan kaki, jari tangan, dan muka.

6) Nyeri abdomen yang hebat

Nyeri abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah yang hebat, menetap, dan tidak hilang setelah istirahat. Gejala ini bisa mengarah pada gejala pre-eklamsia jika di dukung dengan tanda bahaya dan gejala pre-eklamsia yang juga dirasakan.

7) Bayi kurang bergerak seperti biasa

Gerakan janin atau tidak ada atau kurang (minimal 3 kali dalam 1 jam) ibu mulai merasakan gerakan bayi selama bulan ke-5 atau ke-6. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal. Jika bayi tidur gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 1 jam jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik. Jika ini berarti terjadi bahaya pada janin.

8) Keluar air ketuban sebelum waktunya

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah apabila terjadi sebelum persalinan berlangsung yang disebabkan karena kurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan *intra uteri* atau oleh kedua faktor tersebut, juga karena adanya infeksi yang dapat berasal dari vagina dan serviks dan penilainnya ditentukan dengan adanya cairan yang keluar dari vagina. Penentuan cairan ketuban dapat dilakukan dengan test lakmus (*nitrazin test*) merah menjadi biru.

9) Demam tinggi

Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Penanganan demam antara lain dengan istirahat baring, minum banyak dan mengompres untuk menurunkan suhu. Demam dapat disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh wanita hamil yang kemudian menyebabkan

timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Pada infeksi dapat terjadi selama kehamilan, persalinan dan masa nifas (Saifuddin, 2013: 45-48).

B. PERSALINAN

1. Konsep Dasar Persalinan

a. Pengertian Persalinan

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan ibu sendiri) (Manuaba, 2017: 157).

Definisi persalinan yang tepat kontraksi uterus yang memperlihatkan pendataran dan dilatasi serviks tidak mempermudah klinisi dalam menentukan kapan sebenarnya persalinan dimulai karena diagnosis ini dapat dipastikan secara retrospektif. Persalinan umumnya berdasarkan besarnya dilatasi yang disertai oleh kontraksi yang nyeri (Cunningham, 2017: 402).

Persalinan normal adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati, yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks, dan akhir dengan kelahiran plasenta (Varney, 2008: 672).

Persalinan merupakan persalinan normal yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir, serta upaya pencegahan komplikasi terutama perdarahan pasca-persalinan, hipotermia dan asfiksia pada bayi baru lahir (Prawihardjo, 2016 : 334).

b. Fisiologi Persalinan

Kehamilan secara umum ditandai dengan aktivitas otot polos miometrium yang relatif tenang yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan janin *intrauterine* sampai dengan kehamilan aterm. Menjelang persalinan, otot polos uterus mulai menunjukkan aktivitas kontraksi secara terkoordinasi, diselingi dengan suatu periode relaksasi, dan mencapai puncaknya menjelang persalinan, serta secara berangsur

menghilang pada periode postpartum. Beberapa jam terakhir kehamilan ditandai dengan adanya kontraksi yang menyebabkan penipisan, dilatasi serviks dan mendorong janin keluar dari jalan lahir (Prawirohardjo, 2016: 296).

Tujuan persalinan normal adalah mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehinggaprinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal (Prawihardjo, 2016: 335).

c. Tanda-tanda persalinan

Ada beberapa tanda-tanda persalinan yaitu:

- 1) Rasa nyeri oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering dan teratur
- 2) Keluar lendir bercampur darah (show) yang lebih banyak karena robekan-robekan kecil pada serviks
- 3) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya
- 4) Pada pemeriksaan dalam, serviks mandatar dan telah ada pembukaan (Mochtar, 2013: 70).


d. Mekanisme Persalinan

Bentuk dan diameter panggul wanita berbeda pada ketinggian yang berbeda bagian presentasi janin menempati jalan lahir dalam proporsi yang besar. Supaya dapat dilahirkan, janin harus beradaptasi dengan jalan selama proses penurunan. Putaran dan penyesuaian lain yang lain yang terjadi pada proses kelahiran manusia disebut mekanisme persalinan. Tujuan gerakan kardinal presentasi puncak kepala pada mekanisme persalinan adalah *engagement*, penurunan, *fleksi*, putar paksi dalam, *ekstensi*, *putar paksi luar (restitusi)*, dan akhirnya kelahiran melalui *ekspulsi* (Cunningham, 2017: 392).

1) Engagement

Apabila diameter biparetal kepala melewati pintu atas panggul, kepala dikatakan telah menancap (*engaged*) pada pintu atas panggul. Pada kebanyakan wanita primipara, hal ini terjadi sebelum persalinan aktif dimulai karena otot-otot abdomennya lebih kendur dan kepala sering sekali dapat digerakkan di atas permukaan panggul sampai persalinan dimulai.

Gambar 2.1 Engagement



Sumber : (Bobak, 2005: 247)


2) Penurunan

Penurunan adalah gerakan bagian presentasi melewati panggul. Penurunan terjadi akibat tiga kekuatan:

- a) Tekanan dari cairan amnion.
- b) Tekanan langsung kontraksi fundus janin
- c) Kontraksi diafragma dan otot-otot abdomen itu pada tahap kedua persalinan. Efek ketiga kekuatan ibu dimodifikasi oleh ukuran dan bentuk bidang panggul ibu dan kapasitas kepala janin dan untuk bermolase.

Tingkat penurunan diukur dengan menggunakan stasiun bagian presentasi. Laju penurunan meningkat pada tahap kedua persalinan. Pada kehamilan pertama, penurunan berlangsung lambat, tetapi kecepatannya sama. Pada kehamilan berikutnya, penurunan dapat berlangsung dengan cepat. Palpasi abdomen (perasat Leopold) dan pemeriksaan dalam sampai bagian presentasi terlihat pada introitus

Gambar 2.2 Penurunan




Sumber : (Bobak, 2005: 247)

3) Fleksi

Segera setelah kepala turun tertahan oleh serviks, dinding panggul, atas dasar panggul, dalam keadaan normal *fleksi* terjadi dan dagu di dekatkan kearah dada janin. Dengan *fleksi*, sub oksipito bregmatika yang berdiameter kecil (9,5 cm) dapat masuk kedalam pintu bawah panggul.

Gambar 2.3 Fleksi




Sumber : (Bobak, 2005: 247)

4) Putar Paksi Dalam

Pintu atas panggul ibu memiliki bidang paling luar pada diameter transversal. Dengan demikian kepala janin melalui pintu atas dan masuk

kedalam panggul sejati dengan posisi oksipito transversal. Akan tetapi, bidang pintu atas panggul yang terluas adalah diameter anterior posterior. Supaya dapat keluar, kepala janin harus dapat berotasi (berputar pada sumbunya). Putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadika, tetapi putaran ini belum selesai sampai bagian presentasi mencapai panggul bawah. Ketika oksiput berputar ke arah anterior, wajah berputar ke arah posterior. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan tulang panggul. Akhirnya, oksiput berada di garis tengah di bawah lengkung pubis. Kepala hampir selalu berputar saat mencapai dasar panggul.

Gambar 2.4 Putar paksi dalam




Sumber : (Bobak, 2005: 247)

5) Ekstensi

Saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan *defleksi* ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala muncul keluar akibat *ekstensi*, pertamanya, kemudian wajah, dan akhir dagu.

Gambar 2.5 Ekstensi



Sumber : (Bobak, 2005: 247)

6) Restitusi dan putar paksi luar

Setelah kepala lahir, bayi berputar hingga mencapai posisi yang sama dengan saat ia memasuki pintu atas panggul. Gerakan ini dikenal sebagai *restitusi*. Putaran 45° membuat kepala janin sejajar dengan punggung dan bahunya. Putaran paksi luar terjadi pada saat bahu *engaged* dan turun dengan gerakan yang mirip dengan gerakan kepala. Seperti telah diketahui, bahu anterior turun terlebih dahulu. Ketika sudah mencapai pintu bawah, bahu berputar kerah garis tengah dan dilahirkan dibawah lengkung pubis. Bahu posterior diarahkan ke arah perineum sampai ia bebas keluar dari introitus vagina

Gambar 2.6 Putar paksi luar




Sumber : (Bobak, 2005: 247)

7) Ekspulsi

Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayinya dikeluarkan dengan gerakan *fleksi lateral* ke arah simfisis pubis. Ketika seluruh tubuh bayi keluar, persalinan bayi selesai. Ini merupakan akhir tahap kedua persalinan dan waktu saat tubuh bayi keluar seluruhnya, dicatat dalam catatan medis (Cunningham, 2017: 396).

Dalam gambar dibawah ini, mekanisme persalinan dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 2.7 Ekspulsi



Sumber : (Bobak, 2005: 247)

e. Tahap Persalinan

Kala persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu :

1) Kala I (Kala Pembukaan)

Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah (*bloody show*) karena serviks mulai membuka (dilatasi) dan mendatar (*effacement*). Pada primigravida serviks mendatar terlebih dahulu, lalu berdilatasi (berlangsung 13-14 jam) dan pada multigravida serviks akan mendatar dan membuka dapat terjadi bersamaan berlangsung 6-7 jam. Kala pembukaan dibagi menjadi 2 fase, yaitu :

- a) Fase laten : pembukaan serviks yang berlangsung lambat sampai pembukaan 3 cm, lamanya 7-8 jam.

- b) Fase aktif : berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 fase. Fase *akselerasi* berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm. Fase dilatasi maksimal berlangsung selama 2 jam, pembukaan cepat menjadi 9 cm. Dan fase *deselelasi* berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam pembukaan menjadi 10 cm (Prawirohardjo, 2016: 303).

2) Kala II (Kala Pengeluaran Janin)

Fase ini dimulai ketika dilatasi serviks lengkap dan berakhir dengan kelahiran janin. Durasi median sekitar 50 menit untuk nulipara dan sekitar 20 menit untuk multipara, tetapi sangat bervariasi. Pada perempuan paritas tinggi dengan riwayat dilatasi vagina dan perineum sebelumnya, dua atau tiga usaha ekspulsif setelah dilatasi serviks lengkap mungkin cukup untuk menyelesaikan proses kelahiran. Pada waktu his, kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka, dan perineum meregang. Dengan his dan mengedan yang terpimpin, akan lahir kepala, diikuti oleh seluruh badan janin (Cunningham, 2017: 407).

3) Kala III (Kala Pengeluaran Uri)

Setelah bayi lahir, kontraksi lahir beristirahat sebentar. Uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat dan berisi plasenta yang menjadi dua kali lebih tebal dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, timbul his pelepasan uri. Dalam waktu 5-10 menit, seluruh plasenta terlepas, terdorong ke vagina, dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas simfisis atau fundus uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah \pm 100-200 cc (Cunningham, 2017: 415).

4) Kala IV

Kala IV adalah kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap bahaya perdarahan postpartum. Lamanya persalinan pada primi sekitar 14 ½ jam, dan pada multipara sekitar 7 ½ jam.

2. Asuhan Persalinan Normal

a. Pengertian Asuhan Persalinan

Asuhan persalinan normal adalah asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir, serta upaya pencegahan komplikasi terutama perdarahan pasca persalinan, hipotermia, dan asfiksia bayi baru lahir (Prawirahardjo, 2016: 334).

Tujuan persalinan normal adalah mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal (Prawirahardjo, 2016: 335).

b. Lima Benang Merah

Ada lima aspek dasar atau lima benang merah, yang penting dan saling terkait dalam asuhan persalinan yang bersih dan aman. Berbagai aspek tersebut melekat pada setiap, baik normal maupun patologis.

Lima benang merah tersebut adalah :

1) Membuat Keputusan Klinik

Membuat keputusan klinik adalah proses pemecahan masalah yang akan digunakan untuk merencanakan asuhan bagi ibu dan bayi baru lahir. Hal ini merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, membuat diagnosis kerja, melaksanakan rencana tindakan dan akhirnya mengevaluasi hasil asuhan atau tindakan yang telah diberikan kepada ibu dan bayi baru lahir.

2) Asuhan Sayang Ibu dan Bayi

Asuhan sayang ibu dan bayi adalah asuhan dengan prinsip saling menghargai budaya, kepercayaan, dan keinginan sang ibu. Tujuan asuhan sayang ibu dan bayi adalah memberikan rasa nyaman pada ibu dalam proses persalinan.

Salah satu prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah mengikutsertakan suami dan keluarga untuk memberikan dukungan selama proses

persalinan dan kelahiran bayi. Asuhan tersebut bias mengurangi umlah persalinan dengan tindakan.

3) Pencegahan Infeksi

Tindakan Pencegahan Infeksi (PI) tidak terpisah dari komponen-komponen lain dalam asuhan selama persalinan dan kelahiran bayi. Tindakan ini harus diterapkan dalam setiap aspek asuhan untuk melindungi ibu, bayi baru lahir, keluarga, penolong persalinan dan tenaga kesehatan lainnya dengan mengurangi infeksi karena bakteri, virus dan jamur. Dilakukan pula upaya untuk menurunkan risiko penularan penyakit-penyakit berbahaya yang hingga kini belum ditemukan pengobatannya, seperti misalnya Hepatitis dan HIV/AIDS.

4) Pencatatan SOAP dan Partograf

Pendokumentasian adalah bagian terpenting dari proses membuat keputusan klinik dalam memberikan asuhan yang diberikan selama proses persalinan. Pendokumentasian SOAP dalam persalinan:

- a) Pencatatan selama fase laten kala I persalinan.
- b) Dicatat dalam SOAP pertama dilanjutkan dilembar berikutnya.
- c) Observasi denyut jantung janin, his, nadi setiap 30 menit.
- d) Observasi pembukaan, penurunan bagian terendah, tekanan darah, suhu setiap 4 jam kecuali ada indikasi.

Partograf merupakan alat untuk memantau kemajuan persalinan dimulai sejak fase aktif.

5) Rujukan

Rujukan dalam kondisi optimal dan tepat waktu ke fasilitas rujukan atau fasilitas yang memiliki sarana lebih lengkap, diharapkan mampu menyelamatkan jiwa para ibu dan bayi baru lahir. Singkatan BAKSOKUDOPN dapat digunakan untuk mengingat hal-hal penting dalam persiapan rujukan untuk ibu dan bayi :

- B : (Bidan) Pastikan ibu didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegawatdaruratan.

- A : (Alat) Bawa perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan, seperti partus set, infuse set, dan tensimeter.
- K : (Keluarga) Beritahu suami dan keluarga tentang kondisi terakhir ibu dan alasan mengapa dirujuk serta siap untuk mendampingi ibu ke tempat rujukan.
- S : (Surat) Berikan surat rujukan yang berisi identifikasi, keluhan, dan tindakan yang sudah diberikan.
- O : (Obat) Bawa obat-obatan yang diperlukan selama perjalanan.
- K : (Kendaraan) Siapkan kendaraan yang akan digunakan untuk merujuk.
- U : (Uang) Ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat dan bahan kesehatan yang diperlukan.
- DO : (Donor) Siapkan donor darah dari keluarga atau masyarakat yang sesuai dengan golongan darah ibu.
- P : (Posisi) Perhatikan posisi ibu hamil saat menuju tempat rujukan.
- N : (Nutrisi) Pastikan nutrisi ibu tetap terpenuhi selama dalam perjalanan (Kemenkes RI, BPPSDM, 2015: 84)

c. Asuhan Persalinan normal

I. Asuhan Sayang Ibu kala I

- (1) Memastikan perlengkapan bahan, dan obat-obatan esensial siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set.
- (2) Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih.
- (3) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk /pribadi yang bersih.
- (4) Memakai sarung tangan DTT atau steril untuk semua pemeriksaan dalam.
- (5) Mengisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik (dengan memakai sarung tangan DTT atau steril) dan meletakkan kembali di partus

set/wadah desinfeksi tingkat tinggi atau steril tanpa mengontaminasi tabung suntik.

Memastikan Pembukaan Lengkap dan Janin Baik

- (6) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi air DTT. Jika mulut vagina, perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan cara menyeka dari depan ke belakang.
- (7) Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi.
- (8) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci tangan kembali.
- (9) Memeriksa Denyut Jantung Janin (DJJ) setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120-160 kali/menit).
 - a. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal.
 - b. Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ, dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf.

II. Asuhan persalinan normal kala II (kala pengeluaran janin)

Menyiapkan Ibu dan Keluarga untuk Membantu Proses Pimpinan Meneran

- (10) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai dengan keinginannya.
 - a. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif.

- b. Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran.
- (11) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman).
- (12) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran :
- a. Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran.
 - b. Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk meneran.
 - c. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan pilihannya (tidak meminta ibu untuk berbaring terlentang).
 - d. Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi.
 - e. Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu.
 - f. Menganjurkan asupan cairan per oral.
 - g. Menilai DJJ setiap lima menit.
 - h. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera dalam waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk ibu primipara atau 60 menit (1 jam) untuk ibu multipara, merujuk segera. Jika ibu tidak mempunyai keinginan untuk meneran.
 - i. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang aman. Jika ibu belum ingin meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak kontraksi-kontraksi tersebut dan beristirahat di antara kontraksi.
 - j. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera.

Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi

- (13) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi.
- (14) Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, di bawah bokong ibu.
- (15) Membuka partus set.
- (16) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan.

Menolong Kelahiran Bayi Lahirnya Kepala

- (17) Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan yang lain di kepala bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernapas cepat saat kepala lahir
- (18) Dengan lembut membersihkan muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih
- (19) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi :
 - a. Jika tali pusat melilit lahir dengan longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi.
 - b. Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklempnya di dua tempat dan memotongnya.
- (20) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Lahir Bahu

- (21) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arcus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior.

- (22) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterior (bagian atas) untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir.
- (23) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di atas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya saat punggung kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki.

Penanganan Bayi Baru Lahir

- (24) Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya (bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang memungkinkan). Bila bayi mengalami asfiksia, lakukan resusitasi.
- (25) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk kering dan biarkan kontak kulit ibu dengan bayi.
- (26) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem ke-2 cm dari klem pertama (kearah ibu).
- (27) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut.
- (28) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, ambil tindakan yang sesuai.
- (29) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya.

III. Kala III (Pengeluaran Uri/plasenta).

Setelah bayi lahir, kontraksi rahim beristirahat sebentar. Uterus teraba keras dengan fundus uterus setinggi pusat, dan berisi plasenta yang menjadi dua kali lebih tebal dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, timbul his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit, seluruh plasenta terlepas, terdorong ke dalam vagina, dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan dengan simfisis atau fundus uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah kira-kira 100-200cc.

Oksitosin

- (30) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi abdomen untuk memastikan adanya bayi kedua.
- (31) Memberitahu kepada ibu bahwa dia akan disuntik
- (32) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan suntikan oksitosin 10 unit I.M di gluteus atau 1/3 atas paha kanan ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu.

Peregangan Tali Pusat Terkendali

- (33) Memindahkan klem pada tali pusat.
- (34) Meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus, Memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain.
- (35) Menunggu uterus berkontraksi dan melakukan penengangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang (dorso kranial) dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversion uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai.
 - a. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu.

Mengeluarkan Plasenta

- (36) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit :
- a. Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM.
 - b. Menilai kandung kemih dan lakukan katektisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu.
 - c. Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan.
 - d. Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya.
 - e. Lakukan manual plasenta jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit.
- (37) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpinil. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut.
- a. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan DTT atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem atau forceps DTT atau steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal.

IV. Kala IV (Kala Pengawasan)

Selama 1 jam setelah bayi dan uri keluar untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap bahaya perdarahan postpartum.

- (38) Pemijatan Uterus
- (39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus menjadi keras).

Menilai Perdarahan

- (40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa plasenta dan

selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantong plastik atau tempat khusus.

- (41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif.
Melakukan Prosedur Pascapersalinan
- (42) Menilai ulang kontraksi uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik.
- (43) Mencilupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering.
- (44) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau mengikat tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat.
- (45) Mengikat satu lagi simpul mati dibagian pusat yang berseberangan dengan simpul mati yang pertama.
- (46) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya kedalam larutan klorin 0,5%.
- (47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering.
- (48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI.
- (49) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan pervaginam :
 - a. 2-3 kali dalam 15 menit pertama pascapersalinan
 - b. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan
 - c. Setiap 20-30 menit pada jam kedua pascapersalinanJika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan perawatan yang sesuai untuk menataklaksana atonia uteri
- (50) Mengajarkan anggota keluarga bagaimana melakukan masase uterus apabila kontraksi uterus tidak baik dan memeriksa kontraksi uterus.

- (51) Mengevaluasi kehilangan darah.
- (52) Memeriksa tekanan darah, nadi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama satu jam pertama pascapersalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pascapersalinan.
 - a. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama dua jam pertama pascapersalinan.
 - b. Melakukan tindakan yang sesuai untuk tindakan yang tidak normal.

Kebersihan dan Keamanan

- (53) Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas peralatan setelah dekontaminasi.
- (54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai.
- (55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah. Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering.
- (56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI. Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkan.
- (57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5% dan membilas dengan air bersih.
- (58) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
- (59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir.

Dokumentasi

- (60) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang) (Prawiroharjo, 2016: 341).

d. Partograf

Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama persalinan. Tujuan utama penggunaan partograf adalah mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan, dan mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Yang ada di partograf adalah:

- 1) Informasi Tentang Ibu :
 - a) Nama, umur
 - b) Gravida, para, abortus (keguguran)
 - c) Nomor catatan medic/nomor Puskesmas
 - d) Tanggal dan waktu mulai dirawat
 - e) Waktu pecahnya selaput ketuban
- 2) Kondisi janin
 - a) DJJ (Denyut Jantung Janin)
 - b) Warna dan adanya air ketuban;
 - c) Penyusupan (molase) kepala janin.
- 3) Kemajuan Persalinan
 - a) Pembukaan serviks
 - b) Penurunan bagian terbawah janin atau presentasi janin
 - c) Garis waspada dan garis bertindak.
- 4) Jam dan waktu
 - a) Waktu dimulai fase aktif persalinan
 - b) Waktu aktual saat pemeriksaan atau persalinan.
- 5) Kontraksi Uterus
 - a. Frekuensi dan lamanya
- 6) Obat-obat dan cairan yang diberikan
 - a) Oksitosin
 - b) Obat-obatan lainnya dan cairan IV yang diberikan
- 7) Kondisi ibu
 - a) Nadi, tekanan darah dan temperatur tubuh
 - b) Urin (Volume, Aseton)

8) Asuhan, pengamatan dan keputusan klinik lainnya.

Halaman belakang partograf merupakan bagian untuk mencatat hal-hal yang terjadi selama proses persalinan dan kelahiran, serta tindakan yang dilakukan sejak persalinan kala I hingga kala IV.

a) Kala I :

Partograf melewati garis waspada atau tidak; Masalah lain Penatalaksanaan masalah tersebut; Hasilnya.

b) Kala II:

Adanya tindakan episiotomi atau tidak; Pendamping saat persalinan; Gawat janin; Distosia bahu; Masalah lain; Penatalaksanaan masalah tersebut; Hasilnya

c) Kala III:

Lama kala II berapa menit; Pemberian oksitosin; Peregangan tali pusat terkendali; Rangsangan taktil pemijatan fundus uteri; Plasenta lahir lengkap atau tidak; Plasenta tidak lahir > 30 menit; Laserasi; Derajat laserasi perineum; Tindakan jika atonia uteri; Jumlah perdarahan; Masalah lain; Penatalaksanaan masalah;

d) Kala IV

Kala IV berisi tentang tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus, kontraksi uterus, kandung kemih dan perdarahan. Pemantauan kala IV ini sangat penting terutama untuk menilai apakah ada resiko atau terjadi perdarahan pascapersalinan. Pengisian pemantaun kala IV dilakukan setiap 15 menit pada satu jam pertama setelah melahirkan dan setiap 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Isi semua kolom sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jawab pertanyaan mengenai masalah kala IV pada tempat yang telah disediakan (Prawirohardjo, 2016: 329).

Gambar 2.8 Halaman depan partograf

PARTOGRAF

No. Register _____ Nama Ibu : _____ Umur : _____ G. _____ P. _____ A. _____
 No. Puskesmas _____ Tanggal : _____ Jam : _____ Alamat : _____
 Ketuban pecah Sejak jam _____ mules sejak jam _____

Denyut Jantung Janin (/menit)

Air ketuban Penyusupan

Perubahan serviks (cm) ber lands x
 Tunjung kepala ber lands o

Sentimeter (Cm)

Waktu (jam)

Kontraksi
 lap > 40 3
 0 Menit (dok) 1

Oksitosin U/L tetes/menit

Obat dan Cairan IV

Nadi

Tekanan darah

Suhu °C

Urin Protein Aseton Volume

Sumber : (Prawirohardjo, 2016: 318)

Gambar 2.9 Halaman belakang partograf

CATATAN PERSALINAN

- Tanggal :
- Nama bidan :
- Tempat Persalinan :
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindes Rumah Sakit
 Klinik Swasta Lainnya :
- Alamat tempat persalinan :
- Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV
- Alasan merujuk :
- Tempat rujukan :
- Pendamping pada saat merujuk :
 Bidan Teman
 Suami Dusun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

- Partogram melewati garis waspada : Y / T
- Masalah lain, sebutkan :
- Penatalaksanaan masalah Tab :
- Hasilnya :

KALA II

- Episiotomi :
 Ya, indikasi
- Tidak
- Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
- Cawat Janin :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
- Distorsi bahu :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
- Masalah lain, sebutkan :
- Penatalaksanaan masalah tersebut :
- Hasilnya :

KALA III

- Lama kala III : menit
- Pemberian Oksitosin 10 U / m ?
 Ya, waktu : menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan
- Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 Ya, alasan
- Tidak
- Ponegangan tali pusat terkendali ?
 Ya,
 Tidak, alasan

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Pendarahan
1							
2							

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

- Masalah fundus uteri ?
 Ya,
 Tidak, alasan
- Plasenta lahir lengkap (intact) Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.
- Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
- Loosease :
 Ya, dimana
- Tidak
- Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
 Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan
- Atoni uteri :
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
 Tidak
- Jumlah pendarahan : ml
- Masalah lain, sebutkan
- Penatalaksanaan masalah tersebut :
- Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

- Berat badan gram
- Panjang cm
- Jenis kelamin : L / P
- Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit bayi lahir :
- Normal, tindakan :
 mengeringkan
 menghangatkan
 mengang tekil
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
- Aspirasi hidung/pucat/biru/temas/tindakan :
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 mengang tekil menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan
- Cacat bawaan, sebutkan :
- Hipotermi, tindakan :
 a.
 b.
 c.
- Pemberian ASI
 Ya, waktu : jam setelah bayi lahir
 Tidak, alasan
- Masalah lain, sebutkan :
- Hasilnya :

Sumber : (Prawirohardjo, 2016: 324)

C. NIFAS

1. Konsep Dasar Nifas

a. Pengertian Nifas

Masa nifas adalah masa dimulai sejak satu jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. Dan pemenuhan kebutuhan ibu dan bayi, yang meliputi upaya pencegahan, deteksi dini dan pengobatan komplikasi dan penyakit yang mungkin terjadi, serta penyediaan pelayanan pemberian ASI, cara menjarangkan kehamilan, imunisasi, dan nutrisi bagi ibu (Prawirohardjo, 2016: 356).

Masa nifas (puerperium) adalah masa pemulihan kembali mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra hamil (Mochtar, 2013: 87).

Masa nifas adalah periode selama dan tepat setelah kelahiran. Namun secara populer, diketahui istilah tersebut mencakup 6 minggu berikutnya saat terjadi involusi kehamilan normal. (Cunningham, 2017: 443).

b. Perubahan Fisiologi Nifas

Beberapa perubahan yang terjadi secara fisiologi pada masa nifas yaitu sebagai berikut :

1) Sistem reproduksi

Pada sistem reproduksi terjadi beberapa perubahan yaitu :

a) Perubahan pada serviks

Setelah persalinan, bentuk serviks agak menganga seperti corong berwarna merah kehitaman. Konsistensinya lunak, kadang-kadang terdapat perlukaan-perlukaan kecil. Setelah bayi lahir tangan masih bisa dimasukkan ke rongga rahim, setelah 2 jam dapat dilalui oleh 2-3 jari, dan setelah 7 hari hanya dapat dilalui 1 jari (Cunningham, 2017: 674).

b) Vagina dan Ostium Vagina

Pada awal masa nifas, vagina dan ostiumnya membentuk saluran yang berdinding halus dan lebar yang ukurannya berkurang secara perlahan namun jarang kembali keukuran saat nullipara. Rugae mulai

muncul kembali pada minggu ketiga namun tidak semenonjol sebelumnya. Hymen tinggal berupa potongan-potongan kecil sisa jaringan, yang membentuk jaringan parut disebut *carunculae myrtiformes*.

Epitel vagina mulai berproliferasi pada minggu keempat sampai keenam, biasanya bersamaan dengan kembalinya produksi estrogen ovarium. Laserasi atau peregangan perineum selama kelahiran dapat menyebabkan relaksasi ostium vagina (Cunningham, 2017: 674).

2) Uterus

a) Involusi uterus

Segera setelah pengeluaran plasenta, fundus uteri yang berkontraksi tersebut terletak sedikit di bawah umbilikus. Bagian tersebut sebagian besar terdiri dari miometrium yang ditutupi oleh serosa dan dilapisi oleh desidua basalis. Dinding posterior dan anterior, dalam jarak yang terdekat, masing-masing tebalnya 4-5 cm. Segera pascapartum, berat uterus menjadi kira-kira 1000 gr. Karena pembuluh darah ditekan oleh miometrium yang berkontraksi, maka uterus pada bagian tersebut tampak iskemik dibandingkan dengan uterus hamil yang hiperimesis berwarna ungu kemerahan (Cunningham, 2017: 674).

Tabel 2.3 Proses Involusi Uteri

Waktu involusi	Tinggi fundus	Berat uterus (g)
Plasenta lahir	Sepusat	1000
7 hari	Pertengahan pusat-simfisis	500
14 hari	Tidak teraba	350
42 hari	Sebesar hamil 2 minggu	50
56 hari	Normal	30

Sumber : Manuaba, 2017: 192

b) Lokea

Pada awal masa nifas, peliruhan jaringan desidua menyebabkan timbulnya duh vagina dalam jumlah yang beragam, duh tersebut dinamakan lokhea yang terdiri dari eritrosit, potongan jaringan desidua, sel epitel dan bakteri (Cunningham, 2017: 676). Lokea dapat dibagi berdasarkan jumlah warnanya adalah sebagai berikut:

- (1) Lokea rubra (kruenta), keluar dari hari ke-1 sampai hari ke-3, berwarna merah dan hitam, dan terdiri dari sel desidu, verniks kesioka, rambut laguno, sisa mekonium an sisa darah
- (2) Lokea sanguilenta, keluar dari hari ke-3 sampai hari ke-7, berwarna putih bercampur merah
- (3) Lokea serosa, keluar dari hari ke-7 sampai hari ke-14 berwarna kekuningan.

3) Payudara dan Laktasi

Secara anatomis, setiap kelenjar mammae yang matang atau payudara terdiri dari 15 sampai 25 lobus. Lobus-lobus tersebut tersusun secara radial satu sama lain dipisahkan oleh jaringan lemak yang jumlahnya bervariasi. Masing-masing lobus terdiri dari beberapa lobus, yang selanjutnya terdiri dari sejumlah besar alveoli, masing-masing alveolus mempunyai duktus kecil yang saling bergabung membentuk satu duktus yang lebih besar untuk setiap lobus. Duktus-duktus tersebut membuka secara terpisah pada papilla mammae, dengan orifisium yang kecil tetapi jelas. Epitel sekretorik alveolus mensintesis berbagai konstituen susu (Cunningham, 2017: 678).

4) Tanda-tanda Vital

a) Tekanan darah

Segera setelah melahirkan, banyak wanita mengalami peningkatan sementara tekanan darah sistolik dan diastolic, yang kembali secara spontan ke tekanan darah sebelum hamil selama beberapa hari.

b) Suhu

Suhu maternal kembali normal dari suhu yang sedikit meningkat selama periode intrapartum dan stabil 24 jam pertama pascapartum.

c) Nadi

Denyut nadi yang meningkat selama persalinan akhir, kembali normal setelah beberapa jam pascapartum.

d) Pernafasan

Fungsi pernafasan kembali pada rentang normal wanita selama jam pertama pascapartum. Nafas pendek, cepat atau pembuluh lain memerlukan evaluasi adanya kondisi-kondisi seperti kelebihan cairan dan embolus paru (Varney, 2008: 961).

c. Perubahan Adaptasi Psikologi Ibu pada Masa Nifas

Perubahan psikologi mempunyai peranan yang sangat penting ada ibu dalam masa nifas. Ibu masa nifas masih sangat sensitif, sehingga diperlukan pengertian dari keluarga terdekat. Peran bidan sangat penting pada masa nifas untuk pengarahan pada keluarga tentang kondisi ibu serta pendekatan psikologi yang dilakukan bidan pada ibu nifas agar tidak terjadi perubahan psikologi patologis.

Adaptasi psikologi yang perlu dilakukan sesuai fase dibawah ini :

1. Fase Taking In

Fase ini merupakan periode ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada saat itu, fokus perhatian ibu untuk dirinya sendiri. Pengalaman selama proses persalinan sering diceritakan secara berulang. Kelelahan membuat ibu cukup istirahat untuk mencegah gejala kurang tidur, seperti mudah tersinggung. Hal ini membuat ibu cenderung menjadi pasif terhadap lingkungannya.

2. Fase Taking Hold

Fase ini berlangsung antara 3 – 10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Selain itu perasaan sangat sensitif sehingga mudah tersinggung jika komunikasi kurang hati-hati. Oleh

karena itu, ibu memerlukan dukungan karena saat ini memerlukan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai penyuluhan merawat diri dan bayinya sehingga tumbuh rasa percaya diri.

3. Fase Letting Go

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Keinginan merawat diri dan bayinya meningkat ada fase ini (Kemenkes RI, BPPSDM, 2015: 137)

2. Asuhan Pada ibu nifas

a. Pengertian Asuhan Pada Masa Nifas

Asuhan pada masa nifas adalah sebagai bentuk pelayanan pascapersalinan harus terselenggara untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi, yang meliputi upaya pencegahan, deteksi dini dan pengobatan komplikasi dan penyakit yang mungkin terjadi, serta penyediaan pelayanan pemberian ASI, cara menjarangkan kehamilan, imunisasi, dan nutrisi bagi ibu (Prawirohardjo, 2016: 356).

b. Perawatan Ibu pada Masa Nifas

1) Ambulasi Awal

Ibu turun dari tempat tidur dalam beberapa jam setelah persalinan. Pendamping pasien harus ada selama paling kurang pada jam pertama, mungkin saja ibu mengalami sinkop. Kemungkinan ambulasi awal yang terbukti mencakup komplikasi kandung kemih yang jarang terjadi dan yang lebih jarang lagi, konstipasi

2) Rawat gabung

Perawatan ibu dan bayi dalam satu ruangan bersama-sama, sehingga ibu lebih banyak memerhatikan bayinya. Dan dapat member ASI, sehingga kelancaran pengeluaran ASI terjamin.

3) Pemeriksaan umum

Pemeriksaan yang dimulai dari kesadaran, keluhan yang terjadi setelah persalinan (Cunningham, 2017: 683).

c. Kunjungan Pada Masa Nifas

Pada masa nifas terdapat 3 kali kunjungan selama masa nifas, yaitu 6 jam-3 hari post partum, 4-28 hari post partum, dan 29-42 hari post partum.

Tabel 2.4 Kunjungan ada masa Nifas

Kunjungan I (KF) 6 jam sampai 3 hari pasca persalinan	Kunjungan I (KF II) 4 hari sampai 28 hari pasca persalinan	Kunjungan I (KF III) 29 hari sampai 42 hari pasca persalinan
Memastikan involusi uterus	Bagaimana persepsi ibu tentang persalinan dan kelahiran bayi	Permulaan hubungan seksual
Menilai adanya tanda demam,infeksi, atau perdarahan	Kondisi payudara	Metode KB yang digunakan.
Memastikan ibu mendapatkan makanan, cairan, dan istirahat	Ketidaknyamanan yang dirasakan ibu	Latihan pengencangan otot perut
Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda infeksi	Istirahat ibu	Fungsi pencernaan, konstipasi, dan bagaimana penanganannya
Bagaimana perawatan bayi sehari-hari		Hubungan bidan, dokter, dan RS dengan masalah yang ada
		Menanyakan pada ibu apa sudah haid

Sumber: (Kemenkes RI, BPPSDM, 2015: 138).

d. Kebutuhan Masa Nifas

Pada masa pasca persalinan, seorang ibu memerlukan:

1) Nutrisi dan Cairan

- a. Mengonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari
- b. Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari
- c. Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi, setidaknya selama 40 hari pasca persalinan.

2) Pemberian Kapsul Vitamin A 200.000 IU

Kapsul A pada masa ini diberikan dua kali, pertama segera setelah melahirkan, kedua diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A pertama. Manfaat kapsul vitamin A untuk ibu nifas sebagai berikut

- a. Meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI
- b. Bayi lebih kebal dan jarang kena penyakit infeksi
- c. Kesehatan ibu lebih cepat pulih

3) Istirahat dan tidur

Sarankan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur.

4) Seksual

Ibu diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kapan saja ibu siap dan secara fisik aman serta tidak ada rasa nyeri (Kemenkes RI, BPSSDM, 2015: 140).

e. Tanda bahaya pada ibu nifas

Beberapa tanda bahaya masa nifas dan penyakit ibu nifas yaitu

1) Perdarahan lewat jalan lahir

Perdarahan pervaginam yang melebihi 500 ml setelah bersalin didefinisikan sebagai perdarahan pascapersalinan (Saiffudin, 2010: 25).

Penyebab perdarahan pascapersalinan dibedakan atas :

a) Atonia uteri

Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus/kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari

tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir (Prawirohardjo, 2016: 524).

b) Robekan jalan lahir

Robekan jalan lahir merupakan penyebab kedua tersering dari perdarahan pascapersalinan. Robekan dapat terjadi bersamaan dengan atonia uteri. Perdarahan pascapersalinan dengan uterus yang berkontraksi baik biasanya disebabkan oleh robekan serviks atau vagina (Prawirohardjo, 2016: 526).

c) Retensio plasenta

Bila plasenta tetap tertinggal dalam uterus setengah jam setelah anak lahir disebut sebagai retensio plasenta. Plasenta yang sukar dilepaskan dengan pertolongan aktif kala tiga bisa disebabkan oleh adhesi yang kuat antara plasenta dan uterus (Prawirohardjo, 2016: 526).

d) Inversi uterus

Inversi uterus adalah keadaan dimana lapisan dalam uterus (*endometrium*) turun dan keluar lewat ostium uteri eksternum, yang dapat bersifat inkomplit sampai komplit. Inversio uteri ditandai dengan tanda-tanda yaitu syok karena kesakitan, perdarahan banyak bergumpal, di vulva tampak endometrium terbalik dengan atau tanpa plasenta yang masih melekat (Prawirohardjo, 2016: 527).

2) Kelainan pada payudara saat nifas

a) Bendungan air susu

Bendungan air susu dapat terjadi pada hari ke-2 atau ke-3 ketika payudara telah memproduksi air susu. Bendungan disebabkan oleh pengeluaran air susu yang tidak lancar, karena bayi tidak cukup sering menyusui, produksi meningkat, terlambat menyusukan, hubungan dengan bayi (*bonding*) kurang baik, dan dapat pula karena adanya pembatasan waktu menyusui (Prawirohardjo, 2016: 380).

b) Mastitis

Pada masa nifas dapat terjadi infeksi dan peradangan *parenkim* kelenjar payudara (mastitis). Mastitis bernanah dapat terjadi setelah

minggu pertama pascasalin, tetapi biasanya tidak sampai melewati minggu ketiga atau empat). Gejala awal mastitis adalah demam yang disertai menggigil, nyeri, dan takikardia. Pada pemeriksaan payudara membengkak, mengeras, lebih hangat, kemerahan, dan disertai rasa nyeri (Prawirohardjo, 2016: 380).

D. BAYI BARU LAHIR

1. Konsep Dasar Bayi Baru Lahir

a. Pengertian Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37–42 minggu dan berat badannya 2.500-4.000 gram (Prawirohardjo, 2016).

Bayi baru lahir adalah bayi di beberapa jam pertama kehidupan ektrauteri yang berpindah dari ketergantungan total kemandirian fisiologi (Varney, 2016: 878).

b. Ciri-ciri bayi normal

Beberapa ciri-ciri bayi normal adalah sebagai berikut :

(1) Berat badan 2500-4000 gram, (2) Panjang badan 48-50 cm, (3) Lingkar dada 30-38 cm, (4) Lingkar kepala 33-35 cm, (5) Frekuensi jantung 120-160 kali permenit, (6) Pernafasan kira-kira 40-60 kali permenit, (7) Kulit kemerahan karena licin karena jaringan su kutan yang cukup (8) Rambut kepala biasanya telah sempurna (9) Kuku agak panjang dan lemas (10) Nilai apgar >7 (11) Bayi lahir langsung menangis kuat (12) Gerakan aktif (13) Refleks sucking (menghisap) sudah baik (14) Refleks moro (gerakan memeluk bila dikagetkan) sudah baik (15) Refleks grasping (menggenggam) sudah baik (16) Refleks rooting (mencari puting susu) sudah mulai baik (17) Eliminasi baik yang ditandai dengan keluarnya mekonium dalam 24 jam pertama kelahiran dan berwarna hitam kecoklatan (Bobak, 2015: 385).

c. Perubahan Fisiologi Bayi Baru Lahir

Fisiologi bayi baru lahir

Bayi baru lahir normal terus beradaptasi dengan kehidupan diluar kandungan pada beberapa minggu pertama kelahiran. Kondisi ini membutuhkan penyediaan lingkungan yang optimal. Kehidupan diluar kandungan memunculkan tantangan tersendiri bagi bayi baru lahir (Myles, 2009: 708).

1) Sistem pernapasan

Pada saat lahir, sistem pernapasan bayi masih belum berkembang sempurna, pertumbuhan alveoli baru terus berlangsung hingga beberapa tahun. Bayi normal memiliki frekuensi pernapasan 30-60 kali per menit, pernapasan diafragma, dada dan perut naik dan turun secara bersamaan (Myles, 2009: 710).

2) Sistem kardiovaskular dan darah

Frekuensi jantung bayi cepat sekitar 120-160 kali per menit, serta berfluktuasi selaras dengan fungsi pernapasan bayi, aktivitas, atau dalam kondisi tidur atau istirahat.

3) Pengaturan suhu

Pengaturan suhu pada neonatus masih belum baik selama beberapa saat. Karena hipotalamus bayi masih belum matur, pengaturan suhu belum efisien, dan bayi masih rentan terhadap hipotermia. Oleh karena itu bayi berusaha mempertahankan panas tubuh dengan melakukan postur fleksi janin yang meningkatkan frekuensi pernapasan dan aktivitasnya. Suhu inti normal bayi sekitar 36-37°C.

4) Sistem ginjal

Meskipun fungsi ginjal mulai sejak janin, beban kerjanya masih minimal hingga setelah kelahiran. Ginjal masih belum berfungsi sempurna. Sehingga laju filtrasi glomerulus masih rendah dan kemampuan reabsorpsi masih terbatas.

5) Sistem pencernaan

Saluran pencernaan bayi baru lahir secara struktur telah lengkap meskipun fungsinya masih belum sempurna jika dibandingkan dengan saluran pencernaan dewasa.

6) Adaptasi imunologi

Bayi baru lahir memperlihatkan kerentanan nyata terhadap infeksi, terutama yang masuk melalui mukosa sistem pernapasan dan pencernaan. Ada 3 imunoglobulin yaitu IgG, IgA, IgM. Imunoglobulin memberikan kekebalan terhadap infeksi virus yang spesifik. IgG berfungsi untuk memberikan kekebalan pasif pada beberapa bulan pertama kehidupan. IgM yang relatif rendah diperkirakan bayi lebih rentan terhadap infeksi entrik. Kadar IgA berfungsi melindungi terhadap infeksi saluran pernafasan, saluran pencernaan dan mata. ASI dan terutama kolostrum, memberikan kekebalan pasif pada bayi.

7) Sistem reproduksi

Pada bayi laki-laki, testis turun ke skrotum yang memiliki rugae dan meatus uretra bermuara di ujung penis, dan prepusium melekat di kelenjar. Pada bayi perempuan yang lahir aterm, labia mayora menutupi labia minora, hymen dan klitoris dapat tampak sangat besar (Mayles, 2009: 710).

2. Asuhan Bayi Baru Lahir

Asuhan bayi baru lahir adalah asuhan yang diberikan pada bayi tersebut selama dua jam selama jam pertama setelah kelahiran. Sebagian besar bayi baru lahir akan menunjukkan usaha pernapasan spontan dengan sedikit bantuan atau gangguan. Aspek-aspek penting dari usaha segera bayi baru lahir seperti : jaga agar bayi tetap kering dan hangat; usaha adanya kontak kulit antara bayi dan ibunya sesegera mungkin (Saifuddin, 2013: 30).

Bayi normal akan menangis spontan segera setelah lahir, apabila bayi tidak langsung menangis penolong segera membersihkan jalan nafas dengan cara sebagai berikut:

- a. Letakkan bayi pada posisi telentang ditempat yang keras dan hangat.
- b. Gulung sepotong kain dan letakkan dibawah bahu sehingga leher bayi lebih
- c. Lurus dan kepala tidak menekuk. Posisi kepala diatur lurus sedikit mengadiah kebelakang.
- d. Bersihkan hidung, rongga mulut dan tenggorokan bayi dengan jari tangan yang di bungkus dengan kasa steril.
- e. Tepuk kedua telapak kaki bayi sebanyak 2-3 kali atau gosok kulit bayi dengan kain kering dan kasar.

1) Memotong dan merawat tali pusat

Tali pusat dipotong atau sesudah plasenta lahir tidak begitu menentukan dan tidak akan mempengaruhi bayi, kecuali pada bayi kurang bulan. Apabila bayi lahir tidak menangis, maka tali pusat harus segera dipotong untuk memudahkan tindakan resusitasi pada bayi. Tali pusat dipotong 5 cm dari dinding perut bayi dengan gunting steril dan diikat dengan pengikat steril.

2) Mempertahankan suhu tubuh bayi

Pada waktu bayi baru lahir, bayi belum mampu mengatur tetap suhu badannya, dan membutuhkan pengaturan dari luar untuk membuatnya tetap hangat. Bayi baru lahir harus dibungkus hangat, suhu tubuh merupakan tolak ukur kebutuhan akan tempat tidur yang sangat sampai suhu tubuhnya sudah stabil.

3) Memberikan Vitamin K

Kejadian perdarahan karena defisiensi Vitamin K pada bayi baru lahir dilaporkan cukup tinggi, berkisar 0,25-0,5 %. Untuk mencegah terjadinya perdarahan tersebut, semua bayi baru lahir normal dan cukup bulan perlu diberi Vitamin K per oral 1 mmg/hari selama 3 hari, sedangkan bayi resiko tinggi di beri Vitamin K parenteral dengan dosis 0,5-1 ml I.M.

4) Memberikan obat tetes/salep mata

Dibeberapa negara perawatan mata bayi baru lahir secara hukum diharuskan untuk mencegah terjadinya oftalmia neonatorum Didaerah

dimana prevalensi gonorea tinggi, setiap bayi baru lahir diberi salep mata sesudah 5 jam bayi lahir. Pemberian obat mata eritromisin 0,5 % atau tetrasiklin 1% dianjurkan untuk pencegahan penyakit mata karena clamidia atau penyakit menular seksual (Prawirohardjo, 2016: 371).

Tabel 2.5 Penilaian APGAR skor.

Tanda	0	1	2
<i>Apprance</i> (warna kulit)	Pucat/biru seluruh tubuh	Tubuh merah, ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerahan
<i>Pulse</i> (denyut jantung)	Tidak ada	< 100	>100
<i>Grimace</i> (tonus otot)	Tidak ada	Sedikit gerakan mimik	Batuk/bersin
<i>Activity</i> (aktivitas)	Tidak ada	Sedikit gerak	Gerak aktif
<i>Respiratory</i> (pernapasan)	Tidak ada	Lemah/tidak teratur	Menangis

Sumber: Mochtar, 2013: 91

a. Tanda Bahaya Bayi Baru Lahir

Bayi harus mendapat pengawasan yang optimal dari ibu dan keluarga. Ada tanda-tanda bahaya yang dialami oleh bayi. Maka dari itu, bidan harus memberitahu kepada ibu kondisi bahaya tersebut, agar segera ditidak lanjuti. Tanda-tanda bahaya bayi baru lahir seperti: Bayi menjadi lesu, tidak mau makan atau memperlihatkan perilaku yang luar biasa, bayi tidak berkemih dalam waktu 24 jam, bayi tidak defekasi dalam waktu 48 jam, tali pusat bayi mulai mengeluarkan bau yang tidak enak, suhu bayi < 36^oC ketika pengukuran suhu dilakukan di ketiak bayi, denyut nadi kurang atau lebih dari 100-120x/menit, pernapasan kurang atau lebih

kurang atau dari 40-60x/menit, sklera bayi berwarna kuning atau warna kulit tampak kuning atau coklat (Varney, 2016: 897).

Tanda bahaya pada bayi baru lahir yaitu : bayi tidak mau menyusui, kejang, bayi demam, badan bayi kuning, gerakan kedua tangan dan kaki lemah, gangguan nafas, tali pusat kemerahan dan bau, kedua mata bayi penuh nanah, dan bayi diare (Kemenkes RI, Buku KIA, 2018: 35).

b. Jadwal Pemberian Imunisasi

Tabel 2.6 Jadwal Pemberian Imunisasi

Umur	Vaksin	Keterangan
0-7 hari	HB0	- Mencegah penularan hepatitis B dan kerusakan hati.
1 bulan	BCG, Polio 1	- Mencegah penularan tuberkulosis (TBC) yang dapat menyebabkan lumpuh layu pada tungkai dan lengan.
2 bulan	DPT-HB-Hib 1, polio 2	- Mencegah difteri yang dapat menyebabkan penyumbatan jalan nafas
3 bulan	DPT-HB-Hib 2, polio 3	- Mencegah pertusi yang dapat menyebabkan batuk rejan (batuk 100 hari)
4 bulan	DPT-HB-Hib 3, polio 4	- Mencegah tetanus yang menyebabkan tetanus - Mencegah HIB yang menyebabkan radang selaput otak (Meningitis)
9 bulan	Campak	- Mencegah terjadinya campak yang dapat mengakibatkan komplikasi radang paru, radang otak dan kebutaan.

Sumber : (Kemenkes RI, Buku KIA, 2018: 49)

c. Kunjungan ulang Bayi Baru Lahir

Tabel 2.7 Kunjungan Neonatus (KN)

Kunjungan	Penatalaksanaan
6- 48 jam setelah bayi lahir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan suhu tubuh bayi, hindari memandikan bayi 2. hingga sedikitnya enam jam dan hanya setelah itu jika tidak 3. terjadi masalah medis dan jika suhunya 36, 5°C. bungkus bayi 4. dengan kain yang kering dan hangat, kepala bayi harus 5. tertutup 6. Pemeriksaan fisik bayi 7. Konseling pemberian ASI 8. Tanda-tanda bahaya yang harus dikenali oleh ibu: pemberian 9. ASI sulit, kesulitan bernapas, warna kulit abnormal 10.(kebiruan), gangguan gastro internal misalnya tidak bertinja 11.selama tiga hari, perut bengkak, tinja hijau tua dan darah 12.berlendir, mata bengkak dan mengeluarkan cairan. 13.Lakukan perawatan tali pusat dengan membungkus dengan 14.kain kasa steril ataupun bersih. 15.Memberikan imunisasi HB 0

Hari ke 3- 7 setelah bayi Lahir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering 2. Menjaga kebersihan bayi 3. Pemeriksaan tanda bahaya seperti tanda infeksi 4. bakteri, icterus, diare dan masalah pemberian ASI 5. Memberikan ASI minimal 10-15 kali dalam 24 jam dalam 2 minggu pasca persalinan 6. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk memberikn ASI eksklusif dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir sesuai dengan buku KIA
Hari ke 8- 28 hari setelah lahir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan bayi 2. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI 3. Menjaga suhu tubuh bayi 4. Memberitahu ibu tentang imunitasi BCG 5. Penanganan dan rujukan bila terdapat penyulit pada bayi

Sumber : (Kemenkes RI, Buku KIA, 2018: 32)

E. KELUARGA BERENCANA

1. Konsep Dasar Keluarga Berencana

a. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana (KB) adalah untuk menjamin tiap individu dan pasangannya memiliki informasi dan pelayanan untuk merencanakan saat, jumlah dan jarak kehamilan (Prawirohardjo, 2016: 23).

KB adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan cara, alat, atau obat-obatan untuk mencegah terjadinya konsepsi (Mochtar, 2013: 195).

Organisasi WHO mendefinisikan keluarga berencana alamiah sebagai metode untuk merencanakan atau mencegah kehamilan melalui observasi tanda dan gejala alami yang muncul pada masa subur sepanjang siklus menstruasi (Varney, 2008: 423).

b. Fisiologi Keluarga Berencana

Pelayanan dan informasi Keluarga Berencana merupakan suatu intervensi kunci dalam upaya meningkatkan kesehatan perempuan dan anak. Banyak pasangan usia subur yang belum mendapat akses pelayanan KB karena berbagai faktor seperti social, ekonomi, perilaku, prosedur dalam sistem pelayanan kesehatan yang perlu diperbaiki dan pengetahuan klien tentang program KB. Oleh karena itu klien harus memperoleh informasi yang cukup sehingga dapat memilih sendiri metode kontrasepsi yang sesuai untuk mereka (Saiffudin, 2013: 24).

c. Jenis-jenis Kontrasepsi

Bagi pasangan yang berencana membatasi kehamilan dapat menggunakan metode KB yang meliputi metode sederhana (Kondom, senggama terputus/koitus ininterruptus), metode efektif dengan hormonal (pil KB, Suntik KB, AKBK, AKDR) dan Metode Kontrasepsi Efektif (MKE/Kontap) (Manuaba, 2017: 438).

Tabel 2.8 Jenis dan Waktu yang tepat untuk ber-KB

No	Waktu Penggunaan	Metode kontrasepsi yang Digunakan
1	Pospartum	KB suntik, AKBK, AKDR, pil KB hanya progesteron, kontap, metode sederhana
2	Pasca abortus	AKBK
3	Saat menstruasi	AKDR, Kontap, Metode sederhana
4	Masa interval	KB suntik, KB susuk, AKDR
5	Post koitus	KB darurat

Sumber: Manuaba, 2010:439

Jenis-jenis Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) antara lain :

1) Alat Kontrasepsi Pil

Estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap perkembangan folikel dan proses ovulasi.

Keuntungan memakai Pil KB yaitu :

- a) Bila minum pil sesuai dengan aturan dijamin berhasil 100%
- b) Dapat dipakai pengobatan terhadap beberapa masalah :
 - (1) Ketegangan menjelang menstruasi
 - (2) Perdarahan menstruasi yang tidak teratur
 - (3) Nyeri saat menstruasi
 - (4) Pengobatan pasangan mandul
- c) Pengobatan penyakit endometriosis
- d) Dapat meningkatkan libido

Kerugian memakai Pil KB yaitu :

- 1) Harus minum pil secara teratur
- 2) Dalam waktu panjang dapat menekan fungsi ovarium
- 3) Penyulit ringan (berat badan bertambah, rambut rontok, tumbuh akne, mual sampai muntah)
- 4) Mempengaruhi fungsi hati dan ginjal (Manuaba, 2010: 442)

2) Suntikan KB

Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg Depo Medrosikprogesteron Asetat dan 5 mg Estradiol Sipionat yang diberikan injeksi IntraMuscular.

Keuntungan memakai suntikan KB yaitu :

- a) Pemberiannya sederhana setiap 8-12 minggu
- b) Tingkat efektifitasnya tinggi
- c) Hubungan seks dengan suntikan KB bebas
- d) Pengawasan medis yang ringan
- e) Dapat diberikan pascapersalinan, pasca-keguguran, dan pasca-menstruasi
- f) Tidak mengganggu pengeluaran laktasi dan tumbuh kembang bayi

- g) Suntikan KB Cylofem diberikan setiap bulan dan peserta Kb akan mendapatkan menstruasi

Kerugian memakai suntikan KB yaitu :

- a) Perdarahan yang tidak menentu
- b) Terjadi amenore (tidak datang haid berkepanjangan)
- c) Masih terjadi kemungkinan hamil
- d) Kerugian atau penyulit inilah yang menyebabkan peserta KB menghentikan suntikan Kb (Manuaba, 2010: 444).

3) Kondom

Kondom tidak hanya mencegah kehamilan, akan tetapi juga mencegah IMS termasuk HIV/AIDS. Kondom merupakan selubung,saung karet yang terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet, plastic, vinil), atau bahan alami yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual (Varney, 2007: 435).

4) Metode Kalender (Metode Ritmik)

Metode ini banyak memiliki keterbatasan karena panjang siklus menstruasi. Metode kalender hanya dapat memprediksi kapan masa subur wanita dalam siklus menstruasinya sehingga kemungkinan besar bisa hamil. Penghitungan yang digunakan saat ini memiliki faktor variasi ± 2 hari disekitar 14 hari sebelum masa menstruasi berikutnya, dua sampai tiga hari bagi sperma untuk dapat bertahan hidup, dan satu hari bagi ovum untuk dapat bertahan hidup sehingga jumlah keseluruhan masa subur adalah 9 hari, Individu wanita dapat mengurangi 20 hari dari panjang siklus terpendeknya untuk menentukan masa subur yang pertama dan 10 hari dari masa siklus menstruasi terpanjang untuk menentukan masa suburnya yang terakhir (Varney, 2007: 424).

5) Metode Suhu Basal tubuh

Metode suhu basal tubuh mendeteksi kapan ovulasi terjadi keadaan ini dapat terjadi karena progesteron, yang dihasilkan oleh korpus luteum, menyebabkan peningkatan suhu tubuh basal. Pendeteksian peningkatan

suhu tubuh ini kemudian dapat mengidentifikasi dua fase siklus menstruasi, yakni fase luteum dan pascaovulasi (Varney, 2007: 426).

6) Metode Amenore Laktasi (MAL)

Metode amenore laktasi menginformasikan bahwa kehamilan jarang terjadi selama enam bulan pertama setelah melahirkan diantara wanita menyusui dan wanita yang tidak memberikan ASI ditambah susu botol. Ovulasi dapat dihambat oleh kadar prolaktin yang tinggi, pemberian ASI dapat mencegah kehamilan lebih dari 98% selama enam bulan pertama setelah melahirkan bila ibu menyusui atau memberi ASI ditambah susu formula dan belum pernah mengalami perdarahan pervaginam setelah hari ke-56 pascapartum (Varney, 2007: 428).

7) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)

Lendir serviks menjadi kental, sehingga mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengurangi transportasi sperma dan dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi dan kesuburan segera kembali setelah implant dilakukan pencabutan.

Keuntungan memakai AKBK yaitu :

- a) Dipasang selama lima tahun, kontrol medis yang ringan
- b) Dapat dilayani didaerah pedesaan
- c) Biaya murah

Kerugian memakai AKBK yaitu :

- a) Menimbulkan gangguan menstruasi, yaitu tidak mendapat menstruasi dan terjadi perdarahan yang tidak teratur
- b) Berat badan bertambah
- c) Menimbulkan akne, ketegangan payudara
- d) Liang sanggama terasa kering (Manuaba, 2017: 446).

8) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

AKDR merupakan alat kontrasepsi yang dapat menimbulkan perubahan pengeluaran cairan, prostaglandin, yang menghalangi kapasitas spermatozoa.

Keuntungan memakai AKDR yaitu :

- a) AKDR dapat diterima masyarakat dunia, termasuk Indonesia dan menempati urutan ketiga dalam pemakaian.
- b) Pemasangan tidak memerlukan medis teknis yang sulit
- c) Kontrol medis yang ringan, penyulit tidak terlalu berat
- d) Pulihnya kesuburan setelah AKDR dicabut berlangsung baik.

Kerugian memakai AKDR yaitu :

- a) Masih terjadi kehamilan dengan AKDR
- b) Terdapat perdarahan (spotting dan menometroragia)
- c) Leukoria, sehingga menguras protein tubuh dan liang sanggama terasa lebih basah
- d) Dapat terjadi infeksi
- e) Tingkat akhir infeksi menimbulkan kemandulan primer atau sekunder dan kehamilan ektopik
- f) Tali AKDR dapat menimbulkan perlukaan portio uteri dan mengganggu hubungan seksual (Manuaba, 2017: 454).

9) Kontrasepsi Mantap

a) Tubektomi

Keuntungan dari tubektomi, permanen, efektif dengan segera, ansietas terhadap kehamilan yang tidak terencana sudah tidak ada. Sedangkan kerugian, melibatkan prosedur bedah dan anestesi, tidak mudah dikembalikan dan harus dianggap sebagai permanent, jika gagal terdapat resiko lebih besar terjadinya kehamilan ektopik.

b) Vasektomi

Vasektomi merupakan prosedur pembedahan yang lebih aman daripada sterilisasi tuba fallopi, dengan angka kesakitan dan angka kematian yang lebih rendah. Tindakan ini lebih sederhana karena vas deferens lebih mudah dicapai, lebih efektif, dan lebih murah.

2. Asuhan Keluarga Berencana

a. Langkah-langkah konseling KB (SATU TUJU)

Dalam memberikan konseling, khususnya bagi calon klien KB yang baru hendaknya dapat diterapkan enam langkah yang sudah dikenal dengan kata kunci SATU TUJU. Kata kunci SATU TUJU sebagai berikut:

- 1 SA: Sapa dan Salam kepada klien secara terbuka dan sopan. Berikan perhatian sepenuhnya kepada mereka dan berbicara ditempat yang nyaman serta terjamin privasinya. Yakinkan klien untuk membangun rasa percaya diri. Tanyakan kepada klien apa yang perlu dibantu serta jelaskan pelayanan apa yang diperolehnya.
- 2 T: Tanyakan pada klien informasi tentang dirinya. Bantu klien untuk berbicara mengenai pengalaman keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, tujuan, kepentingan, harapan, serta keadaan kesehatan dan kehidupan keluarganya.
- 3 U: Uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin, termasuk pilihan beberapa jenis kontrasepsi. Bantulah klien pada jenis kontrasepsi yang paling dia ingini, serta jelaskan pula jenis-jenis kontrasepsi lain yang ada.
- 4 TU: BanTULah klien menentukan pilihannya. Bantulah klien berfikir mengenai apa yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Doronglah klien untuk menunjukkan kenginannya dan mengajukan pertanyaan. Tanyakan juga apakah pasangannya akan memberikan dukungan dengan pilihan tersebut.
- 5 J: Jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya. Setelah klien memilih kontrasepsi jika diperlukan perlihatkan alat/obat kontrasepsinya. Jelaskan bagaimana alat/obat kontrasepsi tersebut digunakan dan bagaimana cara penggunaannya.
- 6 U: Perlunya dilakukan kunjungan Ulang. Bicarakan dan buatlah perjanjian kapan klien akan kembali untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau permintaan kontrasepsi jika dibutuhkan. Perlu juga selalu mengingatkan klien untuk kembali apabila terjadi suatu masalah.

BAB III
PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU P.S
DARI MASA HAMIL DAN PADA IBU M.S SAAT BERSALIN,
NIFAS SAMPAI BAYI BARU LAHIR, SERTA KB
TAHUN 2020

A. MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN

1. KUNJUNGAN KEHAMILAN KE I

Tanggal : 18 Februari 2020 Pukul : 13.45 WIB

a. Data Subjektif (S)

1). Identitas Pasien

Nama : Ibu P.S
Umur : 31 Tahun
Agama : Kristen
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Silakitang

b. Identitas penanggungjawab

Nama : Tuan A.P
Umur : 33 Tahun
Agama : Kristen
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Silakitang

2) Alasan Kunjungan Saat ini

Ibu mengatakan ini kehamilan yang ke empat, datang untuk memeriksa kehamilan.

3) Riwayat Kehamilan Saat ini

a) Riwayat Menstruasi

Ibu mengatakan pertama kali haid yaitu pada umur 17 tahun, lamanya 6-7 hari, siklusnya teratur yaitu 28 hari, dan ganti doek sebanyak 1-2 kali/hari

b) Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu

Ibu G4P3A0H2 anak pertamanya sudah berumur 7 tahun, dengan usia kehamilan aterm, dengan persalinan normal, di tolong oleh bidan di puskesmas, Berat Badan Bayi Baru Lahir 3.500 gr, Panjang Bayi 49 cm, Laktasi : Ibu memberikan ASI dan susu formula sebagai makanan tambahan kepada bayi sampai umur 4 bulan, setelah itu bayi dilanjutkan dengan susu formula, serta nasi yang di giling. Anak kedua berumur 5 tahun 5 bulan, dengan usia kehamilan aterm ditolong oleh bidan, Berat Badan Bayi Baru Lahir 3.500 gr, Panjang Bayi 48 cm, dengan persalinan normal dan tidak ada komplikasi, Laktasi : Ibu memberikan ASI dan susu formula sebagai makanan tambahan kepada bayi sampai umur bayi 2 tahun dan diiringi dengan nasi yang digiling. Anak ketiga meninggal dengan usia 1 dan setelah dibawa ke Rumah Sakit bayi ternyata penyakit jantung, karena riwayat dari Ibunda pasien.

c) Riwayat Kehamilan

Ibu mengatakan HPHT tanggal 21 Juni 2019, sehingga dapat di tafsirkan bahwa persalinan ibu yaitu tanggal 28 Maret 2020, dimana usia kehamilan saat ini yaitu 34 minggu

d) Obat-obatan yang biasa dikonsumsi

Ibu mengatakan mengkonsumsi tablet tambah darah (Fe) sebanyak 80 tablet dan ibu meminumnya didalam hari dengan air putih, saat TM I ibu mengalami mual dan muntah dan diberi folavit.

e) Imunisasi TT

Ibu mengatakan sudah mendapat imunisasi TT sebanyak 2 kali, yaitu pada kehamilan yang pertama dan setelah dikaji ibu mendapat TT kehamilan skrg pada 24 minggu dan 28 minggu.

f) Keluhan-keluhan yang pernah dirasakan ibu

ibu mengatakan bahwa keluhan yang dirasakan ibu pada Trimester I yaitu Mual Muntah dan pusing, Trimester II yaitu merasa lelah, Trimester III sakit pada daerah pinggang.

- g) Pergerakan janin
pergerakan janin pertama kali dirasakan ibu yaitu pada usia 16 minggu yaitu sebanyak ± 10 x/hari.
- h) Pola Makan
Ibu mengatakan makan 3x sehari dengan porsi 1 piring dengan jenis makanan yaitu nasi, lauk : ikan, daging, telur, tahu, tempe, semua di masak secara bervariasi setiap harinya, sayur : daun ubi, bayam, sayur putih, wortel, kol, kentang, bayam, kangkung, dll, semua dimasak secara bervariasi setiap harinya, buah-buahan: pisang, jeruk, dimakan bervariasi setiap minggunya.
- i) Pola Minum
Ibu mengatakan minum sebanyak $\pm 6-8$ gelas perhari.
- j) Pola istirahat
Ibu mengatakan istirahat siang yaitu 1 jam dan pada malam hari yaitu 6-7 jam
- k) Pola eliminasi
Ibu mengatakan BAB sebanyak ± 1 kali sehari dengan konsistensi lunak berwarna kuning kecoklatan dan tidak ada bercampur darah, BAK sebanyak $\pm 6-7$ kali perhari
- l) Personal Hygiene
Ibu mengatakan mandi 2 kali/sehari, gosok gigi 2 kali/hari, keramas 2 kali/minggu dan ganti pakaian dalam sebanyak 2-3 kali/ hari.
- m) Kontrasepsi yang digunakan sebelumnya
Ibu mengatakan sudah pernah menggunakan KB Implan selama 3 tahun, setelah persalinan pertama
- n) Riwayat kesehatan
Ibu mengatakan tidak mempunyai penyakit menahun, menular dan menurun
- o) Riwayat sosial
Ibu mengatakan kehamilan ini direncanakan status pernikahan sah, dan respon keluarga terhadap kehamilan senang.

b. Data Objektif (O)

1). Pemeriksaan Umum

- a. Status emosional : Baik
 Tingkat kesadaran , : Composmentis

b. Pemeriksaan fisik

- BB saat hamil : 68 kg
- BB sebelum hamil : 60 kg
- TB : 150 cm
- LILA : 29 cm

c. Tanda vital

- TD : 110/70 mmhg
- RR : 20 x/ i
- Pols : 72 x/i
- Suhu : 36.8⁰C

d. Pemeriksaan fisik

(1). Kepala : Bersih

(2). Wajah

- Oedema : tidak ada
- Cloasma gravidarum : tidak ada
- Pucat : Pucat

(3). Mata

- Conjungtiva : merah muda
- Sclera mata : putih
- Oedema palpebra : tidak ada

(4). Hidung

- Polip : tidak ada
- Pengeluaran : ada, dalam batas normal

(5). mulut

- Lidah : bersih
- Gigi : baik
- Caries : tidak ada

- Epulis : tidak ada
- Tonsil : baik

(6). Telinga

- Pengeluaran : Ada, dalam batas normal

(7). Leher

- Luka bekas operasi : tidak ada pembengkakan
- Kelenjar thyroid : tidak ada pembengkakan
- Pembuluh limfe : baik

(8). Pembesaran vena jugularis : Tidak ada Pembengkakan

(9). Pemeriksaan Payudara :

- Mamae : simetris
- Areola mammae : hiperpigmentasi
- Puting susu : menonjol
- benjolan : tidak ada
- Pengeluaran : Kolostrum sudah ada

(9). Aksila

Pembesaran kelenjar getah bening : tidak ada

(10). Abdomen

- Pembesaran : Sesuai dengan usia kehamilan
- Linea/striae : Linea nigra/albican
- Bekas luka operasi : tidak ada
- Pergerakan janin : aktif ± 10 x/hari

e. Pemeriksaan khusus kebidanan (palpasi abdomen)

(11). Leopold I : Dibagian fundus ibu teraba bulat lembek dan tidak melenting (bokong)

TFU : 30 cm

Leopold II :- Abdomen sebelah kanan ibu teraba keras memanjang, memapan (punggung)

- Abdomen sebelah kiri ibu teraba bagian kecil janin (ekstremitas)

Leopold III : Bagian terbawah janin teraba keras, bulat, melenting (kepala)

Leopold IV : Bagian terbawah belum masuk PAP (konvergen)

- Usia kehamilan : 34 minggu
- TBBJ : $(30-13) \times 155 = 2635$ gram
- Auskultasi : DJJ : 132 x/menit

(12). Genitalia

- Pengeluaran : tidak ada
- Varises : tidak ada
- Kemerahan/lesi : tidak ada

(13). Periksa ketuk/pinggang (CVAT) : tidak ada nyeri

(14). Ekstremitas

- Jumlah jari tangan/kaki : lengkap
- Kaki dan tangan simetris : ya
- Oedem pada tangan/kaki : tidak ada
- Varices : tidak ada
- Refleks patella : aktif

e. Pemeriksaan penunjang

- HB : Tidak Dilakukan
- Urine protein : Tidak Dilakukan
- Glukosa urine : Tidak Dilakukan

c. Analisa (A)

G4P3AOH2 dengan usia kehamilan 34-36 minggu dengan Kehamilan Normal

d. Penatalaksanaan (P)

1. Menjelaskan kondisi ibu dan janin saat ini. Dimana keadaan umum ibu baik, TD 110/70 mmHg, Kenaikan Berat badan saat hamil: 8 kg, LILA:

29 cm, UK: 34 minggu, TTP: 28 Maret 2020. Keadaan janin sehat dan DJJ: dalam batas normal, letak janin normal, TBBJ: 2635 gram

Evaluasi : Ibu mengerti kondisinya dalam batas normal dan janin saat ini dalam keadaan baik.

2. Menjelaskan ketidaknyamanan TM III pada ibu hamil tentang sakit pada bagian pinggang ibu, yang merupakan perubahan fisiologi yang wajar dan dikarenakan ibu banyak melakukan pekerjaan berat, perubahan postur tubuh, cara mengatasi hal tersebut ibu meletakkan bantal dipunggung dan perut ibu saat tidur, melakukan peregangan kaki secara rutin, mengompres punggung dengan handuk hangat.

Evaluasi : Ibu sudah mengerti bagaimana cara mengatasi sakit pada bagian pinggang ibu dan akan mengurangi pekerjaan yang berat.

3. Menjelaskan nutrisi untuk memenuhi Produksi ASI, yaitu menganjurkan ibu banyak minum dan banyak mengonsumsi protein, contohnya; ikan, telur, tahu dan kedelai serta kalsium, seperti susu, keju, dll yang dimana dapat memperlancar ASI ibu

Evaluasi : Ibu akan mengonsumsi makan makanan yang membantu produksi ASI serta meminum air putih yang banyak

4. Menjelaskan pada ibu tentang tanda bahaya kehamilan. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, seperti mata rabun, nyeri kepala hebat, perdarahan, nyeri abdomen yang hebat, kaki dan tangan bengkak, gerakan janin berkurang. Evaluasi : Ibu telah mengerti tentang tanda bahaya kehamilan yang telah dijelaskan dan dapat mengulangi ulasan kembali

5. Menjelaskan pada ibu tanda-tanda persalinan, menjelaskan kepada ibu tanda-tanda persalinan yaitu adanya keluar lendir bercampur darah (bloody show), kontraksi yang adekuat, dan sakit pada daerah pinggang yang menjalar sampai ke perut.

Evaluasi : Ibu telah mengerti tentang tanda-tanda persalinan yang telah dijelaskan dan dapat mengulangi ulasan kembali.

6. Mengingatkan ibu untuk tetap mengonsumsi tablet tambah darah (fe) agar ibu tidak mengalami anemia pada kehamilannya Serta mengingatkan ibu untuk mengonsumsi tablet fe dengan air putih dan tidak dengan teh, kopi, susu karena dapat menyebabkan penyerapan Tablet Fe tidak efektif pada tubuh ibu hamil
Evaluasi : Ibu telah mengonsumsi tablet Fe setelah usia kehamilan 2 bulan dan hingga sekarang secara rutin
7. Menjelaskan pada ibu untuk memberikan ASI penuh sampai bayi berumur 6 bulan dan tanpa makanan tambahan, yang dimana dapat memberikan antibody, membantu gizi bayi serta murah dan mudah didapatkan. Dengan ASI juga dapat membantu pemulihan ibu seperti sebelum hamil.
Evaluasi : Ibu sudah mendengar penjelasan dan mau memberikan ASI pada bayi saat sudah lahir
8. Menganjurkan ibu untuk menjadi akseptor KB dan menjelaskan jenis-jenis KB yang dapat ibu gunakan sesuai persalinan
Evaluasi : Ibu telah mengetahui jenis-jenis KB dan KB yang diinginkan ibu yaitu Implan dikarenakan ibu sudah pernah memakai KB implant yang ternyata cocok pada kesehatan ibu.
9. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 2 minggu sekali dan jika ada keluhan lain
Evaluasi : Ibu akan melakukan kunjungan ulang 2 minggu sekali dan jika ada keluhan.

CATATAN PERKEMBANGAN

2. KUNJUNGAN KEHAMILAN KE II

Tanggal Pengkajian : 9 Maret 2020

Jam : 11.40 WIB

Tempat pengkajian : Puskesmas Pembantu Onan Joro, Pahae Jae

a. Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan ini kehamilan keempat dan tidak pernah abortus, tetapi anak ke tiga telah meninggal, 1 hari setelah persalinan
- 2) Ibu menyatakan nyeri pada pinggang

b. Objektif (O)

- 1) KU : Baik
- 2) TD : 110/70 mmHg
- 3) HR : 78x/i
- 4) RR : 20x/i
- 5) Suhu : 36,7 °C
- 6) BB : 69 kg
- 7) Inspeksi : Terlihat wajah ibu segar
- 8) Palpasi Abdomen
 - a. Leopold 1 : Bagian fundus teraba keras, bulat dan tidak melenting jika digoyang (bokong) dan dilakukan pengukuran tinggi fundus dengan menggunakan pita centi meter 32 cm
 - b. Leopold 2 : Kanan; Bagian fundus teraba bagian panjang dan keras (punggung) Kiri; Bagian fundus teraba bagian kecil tidak beraturan (ekstremitas)
 - c. Leopold 3 : Bagian fundus teraba bagian bulat, keras dan melenting jika digoyangkan (Kepala)
 - d. Leopold 4 : Belum memasuki PAP (Konvergen)
 - e. TFU : 32 cm
 - f. TBBJ : $(32-13) \times 155 = 2790$ gr
 - g. UK : 36 minggu 6 hari
- 9) Auskultasi
 - a. DJJ : Ada (Regular)
 - b. Frekuensi : 145x/i

c. Analisa (A)

G4P3A0H2 dengan Usia kehamilan 36-38 minggu dengan kehamilan normal.

d. Penatalaksanaan (P)

1) Memberitahukan pada ibu hasil pemeriksaan ibu dan janin, dalam batas normal, dari hasil inspeksi ibu terlihat segar, yang teraba di perut bagian atas ibu adalah bokong, TFU 32 cm, yang teraba di bagian kanan perut ibu adalah punggung, di sebelah kiri perut ibu adalah bagian terkecil dari bayi diperkirakan kaki dan tangan, yang teraba di bagian terbawah adalah kepala dan kepala belum memasuki jalan lahir. Tafsiran berat janin ibu 2790 gr dari seluruh hasil pemeriksaan keadaan ibu dan bayi dalam keadaan baik (Sehat).

Evaluasi: Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaannya bahwa keadaan ibu dan janin dalam keadaan baik.

2) Mengingatkan kembali kepada ibu supaya tidak khawatir akan keluhan yang sedang dialaminya seperti nyeri pada pinggang, Nyeri pada pinggang merupakan akibat dari bertambahnya usia janin, dan bertambahnya berat janin yang menyebabkan ibu mengalami nyeri pinggang dan bisa diakibatkan posisi menekuk/membungkuk, mengangkat beban berat. Cara mengurangi nyeri pada pinggang yaitu biarkan postur tubuh yang baik, menekuk kaki dari pada membungkuk saat mengambil benda, hindari membungkuk yang berlebihan, jangan menggunakan sepatu berhak tinggi, berendam di air hangat dan jangan menggunakan kasur yang terlalu empuk.

Evaluasi : Ibu sudah mengetahui cara mengatasi nyeri pinggang dan akan mengurangi pekerjaan yang berbeban berat.

3) Menganjurkan ibu agar mengatur pola makan sehari-hari, seperti mengonsumsi sayur dan buah dan makan-makanan yang berserat lainnya, agar bayi tidak besar dan tidak menghambat persalinan.

Evaluasi: Ibu bersedia untuk mengkonsumsi sayur dan buah agar memenuhi gizi ibu dan bayi.

- 4) Memberitahukan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya persalinan yaitu ketuban pecah dini, perdarahan, pergerakan janin berkurang, tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, nadi lebih dari 100x/i, DJJ kurang dari 120 atau lebih dari 160 menit, Jika ibu mengalami salah satu hal diatas segera datang ke petugas kesehatan.

Evaluasi : Ibu sudah mengetahui tanda-tanda bahaya persalinan dan ibu bersedia datang ke petugas kesehatan jika mengalami hal tersebut.

- 5) Menjelaskan pada ibu bahwa akan dilakukan Cek HB ibu, ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perdarahan pada ibu yang disebabkan karna kurangnya darah, serta untuk mengoptimalkan adanya pendonor saat ibu bersalin.

Evaluasi : Ibu bersedia dilakukan Cek HB.

- 6) Melakukan Cek HB pada ibu dengan cara :

- a) masukkan kurang lebih setes asam klorida / HCl 0,1N ke dalam tabung pengencer hemometer sampai tanda 2
- b) hisaplah darah yang telah diberi EDTA samapi garis 0,5 tepat
- c) hapuslah kelebihan darah yang masih menempel pada bagian luar pipet dengan tissue
- d) masukkan darah ke dalam pipet dasar tabung (hati - hati jangan sampai terjadi gelembung udara)
- e) bilas isi pipet dengan larutan HCl 0,1N yang ada dalam tabung tersebut
- f) lalu campurkan isi tabung tadi supaya darah dan HCl bersenyawa
- g) lalu tambahkan tetes demi tetes aquadest sambil di aduk dengan batang pengaduk hingga warna sama dengan dengan warna standart pada alat hemoglobinometer
- h) kemudian baca kadar hemoglobin yang tertera pada tabung pengencer tersebut

Evaluasi: Ibu telah melakukan Cek HB dan hasilnya 11 gr%

- 7) Mengingatkan kembali kepada ibu tentang penggunaan KB yang telah dijelaskan pada kunjungan pertama, dan menanyakan kembali KB apa yang akan ibu gunakan.

Evaluasi : Ibu telah bersedia menjadi akseptor KB dan memilih KB jangka panjang yaitu AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit)

- 8) Menganjurkan ibu melakukan kembali kunjungan ulang

Evaluasi : Ibu telah paham dan bersedia untuk kunjungan ulang 1 minggu lagi dan jika ada keluhan ibu dianjurkan segera pergi kepetugas kesehatan.

CATATAN PERKEMBANGAN

3. KUNJUNGAN KEHAMILAN KE III

Tanggal pengkajian : 24 Maret 2020

Waktu pengkajian : 12.30 Wib

Pengkaji : Chrisnina BR Sembiring

a. Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya
- 2) Ibu mengatakan sedikit sesak dan pegal-pegal dibagian pinggang

b. Objektif (O)

Kesadaran : Compomentis

Tanda Tanda Vital

- 1) Tekanan Darah : 110/70 mmHg
- 2) Pernafasan : 24x/i
- 3) Nadi : 72x/i
- 4) Suhu : 37°C
- 5) Berat Badan : 70 kg
- 6) Tinggi Fundus : 33 cm
- 7) DJJ : 132x/i

8) Usia Kehamilan : 39 minggu

9) TBBJ : $(33 - 13) \times 155 = 3100$ gram

Palpasi Abdomen

Leopold I : Teraba lunak, bulat, tidak melenting (bokong)

TFU : 33 cm

Leopold II : Kanan : teraba keras, memanjang (punggung)

Kiri : teraba bagian terkecil janin (ekstremitas)

Leopold III : Teraba bulat, keras dan melenting

Leopold IV : Belum memasuki PAP (konvergen)

c. Analisa (A)

G4P3A0H2, usia kehamilan 38-40 minggu, dengan kehamilan normal

d. Penatalaksanaan (P)

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu dan janinnya baik-baik saja

TD : 110/70 mmHg RR : 24x/i

Nadi : 72x/i Suhu : 37°C

DJJ : 132x/i TBBJ : 3255 gram

Evaluasi : Ibu sudah mengetahui keadaan ibu dan janinnya.

2. Memberitahukan pada ibu bahwa sesak nafas pada ibu itu disebabkan karna perut/uterus yang semakin membesar karna bertambahnya usia dan berat badan janin maka janin menekan diafragma. Cara mengatasinya adalah jika ibu tidur sebaiknya tidur miring hindari tidur terlentang.

Evaluasi : Ibu mengetahui kenapa ibu mengalami sesak nafas,

3. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi tablet Fe satu butir tablet fe dimalam hari diminum menggunakan air putih.

Evaluasi : Ibu bersedia untuk tetap mengkonsumsi Tablet Fe.

4. Menganjurkan kepada ibu agar mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat, seperti nasi, ubi, kentang, dan

memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat, seperti buah-buahan dan sayuran hijau.

Evaluasi : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan yang berserat dan mengurangi makanan berkarbohidrat.

5. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk mempersiapkan dana, kendaraan, fisik, mental dan tenaga juga persiapan untuk persalinan seperti : pakaian bayi, pakaian ibu, dan mempersiapkan pendonor darah jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam gawatdarurat.

Evaluasi : Ibu mengerti dan akan mempersiapkannya.

6. Memberitahu ibu tanda-tanda inpartu, seperti :
 - a) Perut mules-mules yang teratur, timbulnya his semakin sering dan lama
 - b) Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir

Evaluasi : Ibu telah mengenali tanda-tanda inpartu.

7. Mengajarkan ibu untuk melakukan mobilitas seperti sering jongkok, goyang kiri kanan, mengepel jongkok, dan berhubungan seksual. Dimana ini dilakukan untuk usaha membantu penurunan kepala dari bayi.

Evaluasi : Ibu bersedia melakukan hal yang dijelaskan bidan

8. Menganjurkan ibu untuk control ulang 1 minggu kedepan atau jika ada keluhan.

Evaluasi : Ibu sudah mengerti dan akan datang kunjungan ulang jika ada keluhan.

B. ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU BERSALIN

Tanggal Pengkajian : Rabu, 26 Februari 2020
 Nama Mahasiswa : Chrisnina Sembiring
 NPM : 17.1603

A. PENGKAJIAN DATA

1. DATA SUBJEKTIF

a). Identitas pasien	b). Identitas Penanggung Jawab
Nama : Ibu M.S	Nama : Tuan. D.S
Umur : 26 Tahun	Umur : 28 tahun
Agama : Kristen	Agama : Kristen
Pendidikan : SMA	Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani	Pekerjaan : Petani
Alamat : Peanornor	Alamat : Peanornor

2. Alasan ke klinik : Ingin Bersalin

3. Keluhan datang : Terasa mules, ada lendir yang bercampur darah

4. Riwayat kesehatan

a). Riwayat kesehatan sekarang

Ibu mengatakan tidak ada riwayat kesehatan sekarang

b). Riwayat kesehatan dahulu

Ibu mengatakan tidak ada riwayat kesehatan dahulu

c). Riwayat penyakit keluarga

Ibu mengatakan ada riwayat Hipertensi pada orantua pasien (Ibu)

5. Riwayat Perkawinan

Nikah 1 kali, umur istri menikah pertama kali 22 tahun, dan umur suami menikah pertama kali 25 tahun Lama pernikahan 3 tahun.

6. Riwayat Obstetri

a) Riwayat Menstruasi

Ibu mengatakan pertama kali haid yaitu pada umur 16 tahun, lamanya \pm 4 hari, siklusnya teratur yaitu 35 hari, dan ganti doek sebanyak 1-2 kali/hari

b) Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu

Ibu G2P1A0 anak pertamanya sudah berumur 2,3 tahun, dengan usia kehamilan aterm, dengan persalinan normal, di tolong oleh bidan di puskesmas, Berat Badan Bayi Baru Lahir 3.500 gr, Panjang Bayi 49 cm, Laktasi : Ibu memberikan ASI sampai bayi umur 2 tahun tanpa makanan tambahan.

c) Riwayat Kehamilan

Ibu mengatakan HPHT tanggal 18 Mei 2019, sehingga dapat di tafsirkan bahwa persalinan ibu yaitu tanggal 25 Februari 2020, dimana usia kehamilan saat ini yaitu 39 minggu 4 hari

d) Obat-obatan yang biasa dikonsumsi

Ibu mengatakan mengkonsumsi tablet tambah darah (Fe) dan TM I, TM II mengonsumsi vitamin byolisin selama kehamilan ini.

e) Imunisasi TT

Ibu mengatakan sudah mendapat imunisasi TT pada kehamilan sebelumnya 2 kali dan mendapat TT 1 kali pada kehamilan sekarang.

f) Keluhan-keluhan yang pernah dirasakan ibu

ibu mengatakan bahwa keluhan yang dirasakan ibu pada Trimester I yaitu Mual Muntah, Trimester II yaitu merasa lelah, Trimester III sakit pada daerah pinggang.

g) Pergerakan janin

pergerakan janin pertama kali dirasakan ibu yaitu pada usia 16 minggu yaitu sebanyak \pm 10 x/hari.

h) Pola Makan

Ibu mengatakan makan 3x sehari dengan porsi 1 ½ piring dengan jenis makanan yang di masak secara bervariasi.

i) Pola Minum

Ibu mengatakan minum sebanyak \pm 7-9 gelas perhari.

j) Pola istirahat

Ibu mengatakan istirahat siang yaitu $\frac{1}{2}$ jam dan pada malam hari yaitu 6-8 jam

k) Pola eliminasi

Ibu mengatakan BAB sebanyak ± 1 kali sehari dengan konsistensi lunak berwarna kuning kecoklatan dan tidak ada bercampur darah, BAK sebanyak $\pm 6-8$ kali sehari

l) Personal Hygiene

Ibu mengatakan mandi 1 kali/sehari, gosok gigi 2 kali/hari, keramas 2 kali/minggu dan ganti pakaian dalam sebanyak 2-3 kali/ hari.

m) Kontrasepsi yang digunakan sebelumnya

Ibu mengatakan selama ini menggunakan KB MAL *metode amenore laktasi* selama 2 tahun terakhir ini

n) Riwayat kesehatan

Ibu mengatakan tidak mempunyai penyakit menahun, menular dan menurun

o) Riwayat sosial

Ibu mengatakan kehamilan ini direncanakan status pernikahan sah, dan respon keluarga terhadap kehamilan senang, pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.

Pada tanggal 26 Februari 2020, pukul 08.00 WIB Ibu M.S umur 26 tahun G2P1A0 hamil 38-40 minggu ibu datang ke Puskesmas Onan Hasang, Pahae Julu dengan keluhan keluar lendir bercampur darah dari kemaluan ibu, pinggang terasa panas dan pegal mulai dari perut ke punggung, perut terasa mules mulai pukul 05.00 WIB.

1. Asuhan Kala I Persalinan

Tanggal : 26 Februari 2020

Pukul : 08.18 WIB

a. Data Subjektif (S)

- 1) Perut panas pegal mulai dari pinggang hingga ke perut
- 2) Perut mulai terasa sakit pukul 05.00 WIB
- 3) Keluar lendir bercampur darah dari kemaluan

b. Data Objektif (O)

- 1) Keadaan Umum : Baik
- 2) TTV :
 - Tekanan Darah : 110/80 mmHg
 - Suhu : 36,6°C
 - Denyut Nadi : 72x/i
 - Pernafasan : 18x/i
- 3) Kontraksi / his : 3x10 menit
 - Lamanya : ≤ 20 detik
- 4) Leopold I : Teraba lembek, bulat dan tidak melenting (Bokong)
 - TFU: 33 cm
 Leopold II : - Abdomen sebelah kanan ibu teraba keras memanjang, memapan (punggung)
 - Abdomen sebelah kiri ibu teraba bagian kecil janin (ekstremitas)

 Leopold III : Teraba bulat, keras dan melenting (Kepala)
 Leopold IV : Sudah memasuki PAP (Divergen)
- 5) TBBJ : $(33-12) \times 155 = 3255$ gram
- 6) DJJ : 142x/i
- 7) Pemeriksaan dalam :
 - Pembukaan : 3 cm
 - Penurunan kepala : 4/5 (Hodge II)
 - Posisi : UUK kanan depan
 - Ketuban : utuh

a. Analisa (A)

Ibu P2A0 inpartu kala I fase laten

b. Penatalaksanaan (P)

- 1) Memberitahukan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan ibu dan janin saat ini dalam kondisi yang baik, tanda-tanda vital ibu normal, TD: 110/70 MmHg, Hr: 72 x/l, RR: 18 x/l, Suhu: 36,5°C pembukaan 3 cm, kontraksi 3x10 menit durasi 20 detik, DJJ 142x/i.
Evaluasi : ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaannya bahwa keadaan ibu dan janin dalam keadaan sehat
- 2) Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi ringan seperti berjalan-jalan, goyang kanan/kiri serta mengajarkan ibu memakai Gym Ball agar mempercepat pembukaan serviks dan penurunan kepala janin.
Evaluasi : ibu bersedia untuk melakukan mobilisasi ringan agar mempercepat penurunan kepala janin dan pembukaan serviks.
- 3) Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan ibu seperti memberikan roti dan teh manis sebagai sumber tenaga pada saat meneran.
Evaluasi : ibu sudah mengkonsumsi sebungkus biskuit dan segelas teh manis
- 4) Menjelaskan kepada ibu agar jangan gelisah, ketakutan, dan cemas karena tidak lama lagi bayi dalam kandungan ibu akan lahir.
Evaluasi : ibu semakin semangat menunggu kelahiran bayinya
- 5) Menganjurkan dan mengajarkan kepada keluarga untuk mengusap daerah punggung ibu pada saat kontraksi uterus sehingga dapat mengurangi rasa sakit dan memberikan rasa nyaman pada ibu.
Evaluasi : keluarga telah mengetahui dan dapat mempraktekkan cara untuk mengurangi rasa sakit dan memberikan rasa nyaman pada saat kontraksi uterus dengan mengusap pada daerah punggung ibu
- 6) Menanyakan kepada ibu siapa yang akan menemani / mendampingi ibu pada saat persalinan nanti.
Evaluasi : ibu ingin didampingi oleh suaminya

Data perkembangan

Tanggal : 26 Februari 2020

Pukul : 12.55 WIB

a. Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan perut semakin mulas semakin sering dan teratur, nyeri pada pinggang sampai ke perut bagian bawah ibu
- 2) Ibu mengatakan ada keluar lendir bercampur darah dari kemaluan

b. Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum: Baik
- 2) TTV :
 - a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg
 - b. Suhu : 36,8° C
 - c. Denyut Nadi : 74x/i
 - d. Pernafasan : 20x/i
- 3) Kontraksi / his : 4x10 menit
 Lamanya : 40 detik
 Leopold I : Teraba lembek, bulat dan tidak melenting (Bokong)
 TFU: 32 cm
 Leopold II : - Abdomen sebelah kanan ibu teraba keras memanjang, memapan (punggung)
 - Abdomen sebelah kiri ibu teraba bagian kecil janin (ekstremitas)
 Leopold III : Teraba bulat, keras dan melenting (Kepala)
 Leopold IV : Sudah memasuki PAP (Divergen)
- 4) TTBJ : $(32-11) \times 155 = 3255$ gram
- 5) DJJ : 146x/i
- 6) Pemeriksaan dalam
 Pembukaan : 7 cm
 Penurunan kepala : 3/5 (Hodge II)
 Posisi : UUK kanan depan
- 7) Ketuban : Utuh

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 inpartu kala I fase aktif dilatasi maksimal

d. Penatalaksanaan (P)

1. Memberitahu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan ibu dan janin saat ini dalam kondisi yang baik, tanda-tanda vital normal yaitu 120/80 mmHg, Suhu: 36,8° C, HR: 74x/l, RR: 20x/l, pembukaan 7 cm, ketuban utuh

Evaluasi : ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaannya

2. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi ringan seperti berjalan-jalan dan apabila ibu sudah lelah ibu dapat tidur miring kiri dan kanan untuk mempercepat penurunan kepala bayi.

Evaluasi : ibu sudah mau melakukan mobilisasi ringan seperti berjalan-jalan, tidur miring kiri dan kanan dan ibu berharap pembukaannya semakin bertambah

3. Menganjurkan kembali kepada keluarga untuk mengusap pada daerah punggung ibu pada saat kontraksi uterus sehingga dapat mengurangi rasa sakit.

Evaluasi :keluarga telah mengetahui dan dapat mempraktekkan cara untuk mengurangi rasa sakit pada saat kontraksi uterus dengan mengusap pada daerah punggung ibu

4. Mempersiapkan alat dan perlengkapan persalinan, obat-obatan esensial, larutan desinfektan, wadah plasenta, dan tempat sampah serta ruangan yang nyaman dan bersih untuk proses persalinan.

Evaluasi : alat, bahan, perlengkapan, dan ruangan telah dipersiapkan

5. Memberitahu dan menjelaskan posisi yang nyaman kepada ibu saat meneran seperti posisi berdiri, merangkak, jongkok, maupun posisi terlentang dengan kaki ditekuk ke arah paha ibu dan memperbolehkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman pada saat meneran.

Evaluasi : ibu sudah mengetahui posisi yang nyaman saat meneran dan memilih posisi berbaring dengan posisi kaki ditekuk ke arah paha ibu

6. Mengajarkan ibu cara meneran yang baik pada saat terjadi kontraksi yaitu kedua tangan berada di pangkal paha ibu, pandangan ke arah perut ibu, dagu menyentuh dada, tidak mengeluarkan suara dan tidak menutup mata pada saat meneran, meneran sesuai dengan anjuran penolong persalinan.

Evaluasi : ibu sudah mengetahui dan dapat mempraktekkan teknik meneran yang benar dan akan meneran sesuai dengan teknik yang telah diajarkan oleh petugas kesehatan

7. Mengajarkan ibu teknik pernafasan yang benar yaitu ibu dianjurkan untuk tarik nafas dalam melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut, tidak meneran saat kepala bayi sudah lahir tetapi menganjurkan ibu untuk meniup ke arah perut ibu atau bernafas cepat sampai seluruh tubuh bayi lahir.

Evaluasi : ibu sudah mengetahui dan dapat mempraktekkan teknik pernafasan yang benar yang telah diajarkan oleh petugas kesehatan

8. Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf mulai dari penghitungan DJJ setiap 30 menit, pemeriksaan air ketuban, pembukaan serviks dan penurunan kepala setiap 4 jam, kontraksi uterus setiap 30 menit, tekanan darah setiap 4 jam, nadi setiap 30 menit, suhu setiap 4 jam.

Evaluasi : telah dilakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf oleh petugas kesehatan yaitu

- a) Pukul 12.55 WIB : DJJ 146x/i, air ketuban utuh, penyusupan 0, pembukaan serviks 7 cm, penurunan kepala 3/5 (Hodge II), kontraksi uterus 4x10 menit durasi 40 detik, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 74x/i, suhu 36,8°C dan pernafasan 20x/i
- b) Pukul 15.35 WIB : DJJ 142x/i, air ketuban jernih, penyusupan 0, pembukaan serviks 10 cm, penurunan kepala 1/5 (Hodge IV), kontraksi uterus 5x10 menit durasi 45 detik, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 78x/i, dan suhu 37°C.

2. Asuhan kala II Persalinan

Tanggal : 26 Februari 2020

Pukul : 15.55 WIB

a. Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan perut mules dan semakin sering
- 2) Ibu mengatakan seperti ingin BAB

b. Data Objektif (O)

- 1) Anus membuka
- 2) Perineum menonjol
- 3) Tampak kepala 5-6 cm di depan vulva
- 4) Pemeriksaan dalam : pembukaan serviks lengkap, ketuban jernih, penurunan kepala 0/5 (Hodge IV), posisi UUB kanan depan, dan presentasi kepala.
- 5) DDJ : 144x/i
- 6) Kontraksi 5x10'45"
- 7) Palpasi abdomen tidak terdapat janin kedua

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 inpartu kala II persalinan

d. Penatalaksanaan (P)

- 1) Menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan ibu dan janin pada saat ini baik, pembukaan sudah lengkap dan membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai dengan keinginannya..

Evaluasi : ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaannya dan bertambah semangat untuk memulai meneran agar dapat segera melahirkan bayinya dengan memilih posisi berbaring sambil kedua kaki ditekuk ke arah paha ibu

- 2) Penolong persalinan menggunakan alat perlindungan diri seperti mitela, masker, celemek, dan sarung tangan steril.

Evaluasi : penolong telah memakai alat perlindungan diri

- 3) Meletakkan kain sarung di atas perut dan di bokong ibu sambil mempersiapkan pakaian bayi.

Evaluasi : Penolong telah meletakkan kain di atas perut dan di bawah bokong ibu serta telah mempersiapkan pakaian bayi

- 4) Menganjurkan ibu untuk meneran jika ada his dan beristirahat di luar his.

Evaluasi : ibu sudah mengetahui dan mau untuk melakukannya yaitu meneran pada saat his dan beristirahat di luar his

- 5) Memimpin persalinan normal pada ibu yaitu :

- a) Melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain, letakkan tangan yang lain di kepala bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meniup perlahan-lahan ke arah perut ibu atau bernapas cepat saat kepala lahir.

Evaluasi : kepala telah tampak di depan vulva dengan diameter 5-6 cm, tangan kanan menahan perineum dengan menggunakan kain bersih sementara tangan kiri menahan di atas kepala bayi agar tidak terjadi defleksi tiba-tiba, kepala bayi segera lahir

- b) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi.

Evaluasi : tidak dilakukan pemeriksaan lilitan tali pusat

- c) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Evaluasi : kepala bayi telah melakukan putar paksi luar

- d) Menempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu bayi lahir, kemudian lahirlah

berturut-turut badan bayi yaitu ekstremitas atas bayi, bokong bayi, ekstremitas bawah bayi.

- e) Mengeringkan bayi dengan menggunakan kain bersih dan menjaga kehangatan bayi agar terhindar dari hipotermi.

Evaluasi : bayi telah dikeringkan dan kehangatan bayi telah terjaga

- f) Segera mengganti kain basah dengan kain kering dan bersih bungkus badan bayi dengan kain bersih dan melakukan IMD dengan posisi kepala bayi berada di kedua belah payudara ibu dan badan tengkurap diatas perut ibu (posisi turtle) dan melakukan Bounding attachment.

Evaluasi : IMD dan Bounding attachment telah dilakukan

- g) Melakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat dengan cara menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi dan mendorong isi tali pusat ke arah ibu, melakukan pengguntingan tali pusat.

Evaluasi : telah dilakukan pemotongan tali pusat

- h) Melakukan Palpasi perut ibu untuk memastikan apakah ada bayi kedua

Evaluasi : tidak ada bayi kedua pada perut ibu

- i) Memberikan suntikkan vitamin K1 1mg intramuscular, dipaha kiri anterolateral setelah IMD

Evaluasi : Vitamin K1 1mg sudah diberikan pada Bayi

- j) Memberikan suntikkan Hepatitis B0 0,5 ml, intramuscular, dipaha kanan anterolateral, diberikan kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1

Evaluasi : Hepatitis B0 0,5 ml sudah diberikan pada bayi

3. Asuhan Kala III Persalinan

Tanggal : 26 Februari 2020

Pukul : 16.20 WIB

a. Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan masih sangat lelah
- 2) Ibu mengatakan perut terasa mules

b. Data Objektif (O)

- 1) Kontraksi uterus ada
- 2) Tinggi fundus uterus setinggi pusat
- 3) Belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 inpartu kala III

d. Penatalaksanaan (P)

- 1) Melakukan Manajemen Aktif Kala III yaitu :
 - a) Penyuntikan Oksiton 10 IU. Beritahu ibu akan disuntikkan oksitosin 10 IU secara IM di bagian paha distal lateral untuk melahirkan plasenta.
Evaluasi : ibu bersedia dan telah dilakukan penyuntikan oksitosin 10 IU dibagian 1/3 atas paha kanan ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu.
 - b) Peregangan Tali Pusat Terkendali. Pindahkan klem 5-6 cm di depan vulva. Setelah uterus berkontraksi dengan baik, lakukan penegangan tali pusat terkendali jika terdapat tanda – tanda pelepasan plasenta yaitu adanya semburan darah, tali pusat semakin panjang dan uterus globular, tegangkan tali pusat dengan menggunakan tangan kanan ke arah bawah sejajar lantai sambil tangan kiri mendorong uterus ke arah belakang atas (dorso kranial) secara perlahan-lahan.
Evaluasi : telah dilakukan peregangan tali pusat terkendali
 - c) Setelah plasenta tampak di depan vulva, jemput plasenta dengan kedua tangan, dan untuk melahirkan selaput plasenta lakukan teknik memilin secara perlahan untk menghindari robekan pada selaput plasenta
Evaluasi : plasenta telah lahir

d) Masase Fundus Uterus. Lakukan masase pada fundus uterus selama 15 detik sehingga uterus berkontraksi dengan baik.

Evaluasi : telah dilakukan masase fundus sehingga uterus dapat berkontraksi dengan baik

2) Menilai kelengkapan plasenta yaitu dari pemeriksaan sisi maternal, sisi fetal, dan panjang tali pusat.

Evaluasi : plasenta lahir lengkap dengan hasil berat plasenta \pm 500 gram, panjang tali pusat \pm 48 cm, jumlah kotiledon 18 buah, diameter \pm 18 cm, insersi sentralis, dan selaput ketuban utuh

3) Mengobservasi jumlah perdarahan

Evaluasi : telah diobservasi jumlah perdarahan yaitu \pm 150 cc

4) Memeriksa robekan jalan lahir pada perineum dan vagina.

Evaluasi : obekan jalan lahir

5) Membersihkan bokong ibu dan membantu ibu untuk memakai doek serta mengganti pakaian ibu.

Evaluasi : ibu telah dibersihkan dan baju ibu telah diganti

4. Asuhan Kala IV Persalinan

Tanggal : 26 Februari 2020

Pukul : 16.30 WIB

a. Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan masih sangat kelelahan setelah bersalin.
- 2) Ibu merasakan senang dengan kelahiran bayinya
- 3) Ibu mengatakan ingin minum

b. Data Objektif (O)

- 1) Manajemen kala III sudah dilakukan
- 2) Kontraksi uterus ibu sudah baik
- 3) TFU 1 jari dibawah pusat
- 4) Plasenta lahir lengkap
- 5) Lochea rubra
- 6) Terdapat robekan jalan lahir derajat II

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 inpartu kala IV

d. Penatalaksanaan (P)

1. Ada tanda-tanda plasenta lahir :

Adanya semburan darah tiba-tiba, tali pusat memanjang, bentuk uterus berubah dari diskoid menjadi globuler

2. Mengevaluasi laserasi pada perineum dan vagina, Meninjau jumlah perdarahan selama kala IV dan melakukan vulva hygiene serta ganti pakaian dalam dengan doek yang bersih.

Evaluasi : Ada robekan jalan lahir dan sudah dijahit, perdarahan dalam batas normal.

3. Memeriksa keadaan ibu

- a) Keadaan Umum : baik
- b) Kesadaran : Composmentis
- c) Tanda-tanda vital
 - TD : 110/80 mmHg
 - RR : 18x/i
 - HR : 72x/i
 - Suhu : 36,8°C
- d) Kontraksi : baik
- e) Perdarahan : 100 cc

Evaluasi : keadaan dan kondisi ibu dalam keadaan baik

4. Melakukan pemeriksaan estimasi perdarahan, pengosongan kandung kemih, supaya menghindari perdarahan postpartum

Evaluasi : tidak terjadi perdarahan postpartum, keadaan ibu dalam keadaan normal

5. Mengajarkan pada keluarga untuk memasase fundus ibu dan tetap melakukan IMD serta memeriksa kontraksi uterus ibu, apabila perut ibu keras berarti kontraksi perut ibu baik, apabila perut ibu lembek berarti kontraksi perut ibu tidak baik dan segera memanggil bidan.

Evaluasi : keluarga mengerti dan bersedia memasase perut ibu dan tetap melakukan IMD serta dapat menilai kontraksi ibu

5. Memeriksa kembali kontraksi uterus dengan cara :
 - a. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama
 - b. Setiap 30 menit pada jam kedua

Tabel 3. 1 Pemantauan kala IV Persalinan

Jam ke	Waktu	TD	Nadi	Suhu	TFU	Kontraksi uterus	Kandung kemih	Perdarahan
1	16.45	110/80	70	36.5	1 Jari dibawah pusat	Keras	Kosong	±50 cc
	17.00	110/80	72		1 Jari dibawah pusat	Keras	±100 cc	±30 cc
	17.15	110/80	75		1 Jari dibawah pusat	Keras	Kosong	±30 cc
	17.30	120/80	74		1 Jari dibawah pusat	Keras	Kosong	±20 cc
2	18.00	120/80	72	36.5	1 Jari dibawah pusat	Keras	± 120 cc	±20 cc
	18.30	120/80	78		1 Jari dibawah pusat	Keras	Kosong	±10 cc
Jumlah Perdarahan								±160 cc

6. Membersihkan semua peralatan dan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, cuci alat kemudian sterilkan, cuci tangan dan memakaikan ibu pakaian yang bersih sampai ibu merasa nyaman.
Evaluasi : Semua alat telah disterilkan dan ibu telah merasa nyaman
7. Melengkapi partograf
Evaluasi : persalinan dipantau menggunakan partograf

C. ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS

Tanggal pengkajian : 27 Februari 2020

Waktu pengkajian : 14.00 WIB

a. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan nyeri pada saat BAK
2. Ibu mengatakan belum buang air besar
3. Ibu mengatakan masih lelah setelah persalinan
4. Ibu mengatakan ASI sudah diberi setiap 2-3 jam
5. Ibu mengatakan nyeri pada perineum

b. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum : Baik
2. Tanda-tanda vital

TD	: 110/70 mmHg
Suhu	: 36,5°C
Nadi	: 74x/i
RR	: 24x/i
3. Kontraksi : baik
4. TFU : 2 jari dibawah pusat
5. Payudara

Putting susu	: menonjol
Pengeluaran	: ASI sudah ada
6. Lochea : rubra
7. Luka Perineum : Masih Basah

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 pospartum hari pertama, nifas normal dengan perdarahan dalam batas normal, lochea ada yaitu lochea rubra berwarna merah segar, ada laserasi jalan lahir derajat II, TFU normal, mobilisasi dini yaitu miring kiri miring kanan, keadaan ibu baik, tidak ada oedem pada ekstremitas.

d. Penatalaksanaan (P)

1. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu, keadaan umum ibu dalam keadaan baik, dengan TD: 110/70 mmHg, RR: 24 x/l, temp: 36,5°C, lochea yang keluar berwarna merah segar (Rubra), Asi sudah keluar, puting susu menonjol dan tidak lecet dan dari seluruh pemeriksaan ibu dalam keadaan normal.

Evaluasi : Ibu telah mengetahui hasil pemeriksaannya

2. Memberitahukan kepada ibu untuk istirahat yang cukup dengan kondisi ibu tetap terjaga dengan baik dan juga istirahat saat bayi sedang tidur

Evaluasi : Ibu telah mengerti kebutuhan istirahat

3. Memberitahu kepada ibu tanda bahaya nifas yaitu :

- a) Perdarahan lewat jalan lahir dan demam lebih dari 2 hari
- b) Keluar cairan berbau dari jalan lahir
- c) Bengkak diwajah, tangan atau kaki dan sakit kepala
- d) Payudara bengkak, merah disertai rasa sakit
- e) Ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab (depresi)

Evaluasi : Ibu telah mengerti tanda bahaya masa nifas

4. Memberitahu kepada ibu untuk menjaga kebersihan dirinya, dengan mandi 1-2x sehari, sikat gigi 2x sehari, dan mengganti doek setiap kali basah.

Evaluasi : Ibu bersedia menjaga kebersihan dirinya

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan payudara,

- a) Tempelkan kompres puting dengan kapas yang sudah diberikan baby oil selama 5 menit, kemudian bersihkan puting susu secara melingkar.
- b) Tempatkan kedua tangan dipayudara kemudian diurutkan kearah atas, kesamping, kebawah melintang sehingga tangan menyanggah payudara (mengangkat payudara) kemudian lepaskan tangan dari payudara
- c) Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri lalu licinkan kedua tangan dengan baby oil untuk melakukan pengurutan yang pertama dengan menggunakan 3 jari secara melingkar dari pangkal hingga ke puting susu secara bergantian
- d) Melakukan pengurutan dengan menggunakan telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan sisi kelingking tangan mengurut payudara kearah puting susu gerakan sebanyak 30 kali tiap payudara
- e) Pengurutan selanjutnya tangan dikepalkan kemudian buku-buku jari tangan mengurut payudara dari pangkal hingga ke puting susu sebanyak 30 kali secara bergantian selesai pengurutan kemudian payudara dikompres dengan waslap hangat selama 2 menit kemudian diganti dengan kompres dingin selama 1 menit secara bergantian.
- f) Keringkan payudara dengan handuk yang bersih dan memasang bra yang menyokong payudara ibu
Evaluasi : Ibu bersedia untuk melakukan perawatan payudara
- g) Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini seperti miring kanan dan kiri yang berguna untuk melancarkan pengeluaran lochea, mengurangi infeksi puerperium, mempercepat involusi alat kandungan, melancarkan fungsi alat perkemihan, meningkatkan peredaran darah sehingga mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sisa metabolisme

Evaluasi : Ibu telah mengerti dan bersedia untuk mobilisasi dini

6. Memeriksa pengeluaran lochea ibu yaitu pengeluaran lochea normal pada hari pertama sampai hari ketiga yaitu lochea rubra berwarna kemerahan

Evaluasi : Ibu telah mengetahui bahwa pengeluaran lochea merupakan hal normal bagi ibu yang baru bersalin

7. Menjelaskan pada ibu tentang perawatan luka perineum yaitu
- a) Untuk membersihkan vagina dan bagian perineum setelah buang air, gunakan air hangat.
 - b) Keringkan area vagina dan perineum menggunakan tisu atau kain yang bersih.
 - c) Ganti pembalut setiap 4-6 jam.
 - d) Biarkan perineum dan vagina sembuh dengan sendirinya. Artinya, jangan terlalu sering mengecek dan menyentuhnya.
 - e) Jangan takut untuk BAB karena jahitannya tidak akan robek. Namun untuk memudahkan dan melancarkan BAB, minumlah banyak cairan dan konsumsilah buah dan sayuran segar.

Evaluasi : Ibu akan menjaga kebersihan di daerah perineum

Kunjungan Nifas Ke II

Tanggal pengkajian : 03 Maret 2020

Waktu pengkajian : 11.15 Wib

Pengkaji : Chrisnina Sembiring

a. Data Subjektif (S)

- 1) Ibu merasa lelah mengurus bayinya
- 2) Ibu mengeluh kurang tidur
- 3) Ibu mengatakan ASI eksklusif tetap diberikan
- 4) Ibu mengatakan sudah bisa berjalan
- 5) Ibu mengatakan darah masih keluar dari vaginanya berwarna Kecoklatan

6) Ibu mengatakan perineum masih terasa sedikit

b. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum : baik
2. Tanda-tanda vital :
 - TD : 100/70 mmHg
 - Suhu : 37°C
 - Nadi : 74x/i
 - RR : 24x/i
3. TFU : 3 jari diatas simfisis
4. Payudara
 - Keadaan : baik
 - Putting susu : menonjol
 - Pengeluaran : ada
5. Lochea : sanguilenta
6. Luka Perineum : Sudah mulai mengering

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 Post partum hari ke 6 dalam keadaan normal

d. Penatalaksanaan (P)

- 1) Memberitahukan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan TTV yaitu TD: 100/70 mmHg, Suhu : 37°C TFU 3 jari diatas simfisis dan tidak ada tanda-tanda infeksi pada masa nifas.
Evaluasi : Ibu mengerti dan ibu merasa senang
- 2) Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal dan mendeteksi adanya perdarahan abnormal. TFU ibu 3 jari diatas simfisis.
Evaluasi : Ibu sudah mengetahui bahwa involusi uterus ibu normal
- 3) Mengobservasi lochea. Lochea adalah cairan yang dikeluarkan dari uterus melalui vagina pada masa nifas normal, yang berbau anyir dan tidak busuk. Pada ibu post partum 6 hari jenis lochea sanguelonenta yaitu berwarna merah kecoklatan.
Evaluasi : Ibu sudah mengetahui dan mengerti bahwa lochea yang dialami ibu lochea sanguelonenta dan itu normal

- 4) Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI karna mengandung bahan yang diperlukan bayi, mudah dicerna, memberi perlindungan terhadap infeksi, selalu segar, bersih dan siap untuk diminum. Sehingga bayi tidak perlu diberikan makanan tambahan sebelum usia 6 bulan disebut pemberian ASI secara eksklusif. Bayi dapat diberikan ASI kapan saja bayi mau. Ibu juga harus memperhatikan brah yang digunakan yaitu brah yang menyokong payudara.

Evaluasi : Ibu telah mengerti dan telah melakukannya

- 5) Mengingatkan kembali ibu untuk istirahat yang cukup dan mengingatkan kembali pada ibu tentang cara mengatasi pola istirahat dan tidur yang menjadikurang karena gangguan bayi yaitu dengan cara ibu ikut tidur pada saat bayi tidur.

Evaluasi : Ibu bersedia untuk istirahat yang cukup

- 6) Menjaga bayi agar tetap hangat dengan melakukan pembedongan yang benar dan tidak kontak langsung dengan udara dingin.

Evaluasi : Ibu sudah mengetahui dan bersedia menjaga kehangatan bayi

- 7) Mengingatkan kembali ibu untuk menjaga kebersihan perineum atau melakukan vulva hygiene, agar luka perineum semakin mengering dan tidak menimbulkan nanah.

Evaluasi : Ibu akan tetap menjaga kebersihan perineum

- 8) Memberitahu kepada ibu dan keluarga jika ada keluhan/masalah yang dialami ibu segera menghubungi bidan.

Kunjungan Nifas Ke III

Tanggal pengkajian : 9 April 2020

Waktu pengkajian : 17.1603 Wib

Pengkaji : Chrisnina Sembiring

a. Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan bayi tidak rewel
- 2) Ibu mengatakan ASI eksklusif tetap diberikan
- 3) Ibu mengatakan darah masih keluar dari vaginanya berwarna kuning kecoklatan
- 4) Ibu mengatakan kering dan ada sedikit rasa gatal

b. Objektif (O)

1. Keadaan umum : baik
2. Tanda-tanda vital :
 - TD : 110/70 mmHg
 - Suhu : 36,8°C
 - Nadi : 70x/i
 - RR : 18x/i
3. TFU : Tidak Teraba
4. Payudara
 - a. Keadaan : baik
 - b. Putting susu : menonjol
 - c. Pengeluaran : Sudah ada
5. Lochea : Alba
6. Luka Perineum : Sudah mengering

c. Analisis (A)

Ibu P2A0 Post partum minggu ke 5 dalam keadaan normal

d. Penatalaksanaan (P)

1. Memberitahukan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yaitu TTV normal TD: 110/70 mmHg; Suhu: 36,8°C; Nadi: 70x/I; RR: 18x/I; TFU tidak teraba; Luka perineum: Sudah mengering.
Evaluasi : Ibu mengerti dan ibu merasa senang bahwa keadaan ibu dalam keadaan normal
2. Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal dan mendeteksi adanya perdarahan abnormal. TFU ibu tidak teraba lagi.

Evaluasi : Ibu sudah mengetahui bahwa involusi uterus ibu normal

3. Mengobservasi lochea. Lochea adalah cairan yang dikeluarkan dari uterus melalui vagina pada masa nifas normal, yang berbau anyir dan tidak busuk. Pada ibu post partum 2 minggu jenis lochea Alba yaitu berwarna Putih.

Evaluasi : Ibu sudah mengetahui dan mengerti bahwa lochea yang dialami ibu lochea Alba dan itu normal

4. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI karna mengandung bahan yang diperlukan bayi, mudah dicerna, memberi perlindungan terhadap infeksi, selalu segar, bersih dan siap untuk diminum. Sehingga bayi tidak perlu diberikan makanan tambahan sebelum usia 6 bulan disebut pemberian ASI secara eksklusif. Bayi dapat diberikan ASI kapan saja bayi mau. Ibu juga harus memperhatikan brah yang digunakan yaitu brah yang menyokong payudara.

Evaluasi : Ibu telah mengerti dan telah melakukannya

5. Mengingatkan kembali ibu untuk istirahat yang cukup dan mengingatkan kembali pada ibu tentang cara mengatasi pola istirahat dan tidur yang menjadikurang karena gangguan bayi yaitu dengan cara ibu ikut tidur pada saat bayi tidur.

Evaluasi : Ibu bersedia untuk istirahat cukup

6. Menjaga bayi agar tetap hangat dengan melakukan pembedongan yang benar dan tidak kontak langsung dengan udara dingin.

Evaluasi : Ibu sudah mengetahui dan bersedia menjaga kehangatan bayi

7. Memberitahu kepada ibu jika ada keluhan segera menghubungi bidan.

Evaluasi : Ibu bersedia melakukannya dan segera memberitahu bidan jika ada keluhan

D. ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR

Tanggal pengkajian : 27 Februari 2020
 Waktu pengkajian : 14.30 WIB
 Pengkaji : Chrisnina Sembiring

I. Kunjungan Neonatal

Pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 16.15 WIB, di Puskesmas Onan Hasang, bayi Ibu M.S dilakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir tali pusat tidak merah. Bayi sudah buang air kecil dan sudah buang air besar, pergerakan aktif, warna kulit kemerahan, menangis kuat.

a. Data Subjektif (S)

Nama bayi : Butet Sitompul
 Umur bayi : 1 hari
 Tanggal/jam lahir : 26 Februari 2020/ 15.55 Wib
 Jenis kelamin : Perempuan
 Anak ke : 2
 Alamat : Peanornor, Pahae Julu

b. Data Objektif (O)

1. Tindakan yang pernah diberikan
 - a) Resusitasi : tidak ada
 - b) Hisapan lendir : tidak ada
 - c) Masase jantung : tidak ada
 - a. Intubasi indotracheal : tidak ada
 - b. O₂ : tidak ada
 - c. DII : tidak ada
2. Pemeriksaan umum
 - a) Pernapasan : 46x/i
 - b) Denyut nadi : 128x/i
 - c) Suhu : 36,8°C

- d) BB lahir : 3300 gram
- e) Panjang Badan : 50 cm
- f) Lingkar Dada : 35 cm
- g) Lingkar Kepala : 33 cm

3. Pemeriksaan Fisik Secara Sistematis

- a) Kepala
 - Rambut : warna hitam
- b) Mata
 - Oedema : tidak ada
 - Conjungtiva : merah muda
 - Sklera : putih/ tidak ikhterik
- c) Hidung : normal
 - Pengeluaran : tidak ada
- d) Mulut : Normal
- e) Gigi : belum ada
- f) Telinga : Normal
- g) Leher : tidak ada pembengkakan
- h) Dada : Normal
- i) Tali pusat : belum puput
- j) Punggung : keras
- k) Ekstremitas : lengkap 5/5
- l) Genitalia : ada
- m) Anus : berlobang
- n) Refleks
 - Refleks Moro : aktif
 - Refleks Rooting : aktif
 - Refleks Sucking : aktif
 - Refleks Plantar : aktif
 - Refleks baby skin : aktif
 - Refleks Palmer : aktif
 - Refleks tonick neck : aktif

- o) Eliminasi
 BAK : sudah ada
 Mekonium : sudah ada
- p) APGAR SCORE :

Tabel 3. 2 Penilaian APGAR SCORE

Gejala	1 menit	5 menit	10 menit
Denyut Jantung (pulse)	2	2	2
Pernapasan (Respiration)	1	2	2
Tonus Otot (Activity)	1	2	2
Kepekaan refleks (gremace)	1	1	1
Warna (apperence)	2	2	2
Jumlah	7	8	9

c. Analisa (A)

Neonatus dengan usia 1 hari lahir dengan spontan

d. Penatalaksanaan (P)

- Melakukan pemeriksaan terhadap bayi dan memberitahukan hasil kepada keluarga yaitu :

BB : 3300 gram HR : 128x/i

PB : 50 cm RR : 46x/i

Keadaan umum bayi : baik

Evaluasi : Telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya telah diberitahukan kepada keluarga

2. Melakukan perawatan tali pusat terhadap bayi dimana disaat kassa basah atau kotor, ibu dan keluarga dianjurkan untuk segera menggantinya tanpa menambahkan apapun pada kassa tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi
Evaluasi : Telah dilakukan perawatan tali pusat
3. Mengajarkan ibu untuk merawat kebersihan bayi dengan mengganti pakaian atau popok bayi setelah BAK dan BAB.
Evaluasi : Ibu bersedia menjaga kebersihan bayi
4. Mengajarkan ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi dimana bayi sampai berumur 6 bulan hanya mendapatkan ASI tanpa makanan tambahan pada bayi dan memberikan ASI setiap saat dimana bayi membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.
Evaluasi : Ibu telah bersedia untuk memberikan ASI eksklusif
5. Mengajarkan ibu untuk menyendawakan bayi pada saat selesai diberikan ASI yaitu dengan cara : menggendong bayi tegak lurus, sandarkan pada bahu lalu tepuk-tepuk halus punggung bayi hingga bayi sendawa
Evaluasi : Ibu telah bersedia untuk menyendawakan bayi
6. Memberitahukan kepada ibu manfaat pemberian ASI, yaitu :
 - a. Meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi
 - b. Sehat, praktis dan tidak butuh biaya
 - c. Mencegah perdarahan pada ibu nifas
 - d. Menjalin kasih sayang ibu dan bayi
 - e. Mencegah kanker payudaraEvaluasi : Ibu telah memahami manfaat pemberian ASI
7. Mengajarkan kepada ibu cara/teknik menyusui yang benar, yaitu : ibu duduk dikursi yang ada sandarannya, membuat penyangga dikaki ibu, bayi digendong menghadap perut ibu, merangsang hisapan bayi dengan meletakkan ujung jari kelingking ditepi bibir bayi, memasukkan seluruh aerola hingga puting susu ibu ke

dalam mulut bayi dan menyusukan bayi dengan payudara diberikan secara bergantian

Evaluasi : Ibu telah mengerti cara/ tehnik menyusui yang benar

8. Memberitahu kepada ibu tanda bahaya bayi baru lahir, seperti :
 - a. Tidak mau menyusui
 - b. Kejang-kejang, diare, kulit dan mata bayi kuning
 - c. Lemah, sesak nafas, demam/panas tinggi dan mata bayi bernanah
 - d. Bayi merintih atau menangis terus menerus
 - e. Tali pusar kemerahan sampai dinding perut, berbau atau bernanah
 - f. Tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat

Evaluasi : Ibu telah mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir

9. Memberitahukan kepada ibu agar mencegah kehilangan panas bayi dimana dapat kehilangan panas melalui : air mandi bayi yang terlalu dingin, bayi yang diletakkan dekat dinding, bayi berada pada ruangan dingin atau jendela terbuka, bayi basah (BAK/BAB) tidak langsung diganti dan bayi yang dekat dengan kipas angin atau AC.

Evaluasi : Ibu telah memahami cara mencegah kehilangan panas bayi

10. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk menelfon atau membawa bayi ke petugas kesehatan jika bayi mengalami keluhan atau masalah

Evaluasi : ibu bersedia membawa bayi ke petugas kesehatan jika ada masalah

II. Kunjungan Neonatal Ke II

Tanggal pengkajian : 03 Maret 2020

Waktu pengkajian : 11.30 Wib

Pengkaji : Chrisnina Sembiring

a. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan tidak ada tanda-tanda kelainan pada bayi
2. Ibu mengatakan bayi dalam keadaan baik
3. Ibu mengatakan masih tetap memberikan ASI Eksklusif

b. Data Objektif (O)

1. Pemeriksaan :

HR : 120x/i

RR : 62x/i

Suhu : 36°C

2. Warna kulit : kemerahan

3. Pergerakan : Aktif

4. Refleksi

Refleksi Moro : aktif

Refleksi Rooting : aktif

Refleksi Sucking : aktif

Refleksi tonic neck : aktif

5. Tali pusat : Sudah puput

c. Analisa (A)

Bayi baru lahir normal 6 hari

d. Penatalaksanaan (P)

1. Memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan bayinya, yaitu :

HR : 120x/i

RR : 62x/i

Temp : 36°C

Warna kulit : Kemerahan

Pergerakan : Aktif

Evaluasi : Ibu telah mengetahui hasil pemeriksaan pada bayinya

2. Mengingatkan kembali kepada ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai berumur 6 bulan hanya mendapatkan ASI tanpa makanan tambahan pada bayi dan memberikan ASI

setiap saat dimana bayi membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dan memberikan ASI sesering mungkin pada bayi

Evaluasi : Ibu bersedia untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya.

3. Memberitahukan kepada ibu untuk tetap mencegah kehilangan panas pada bayi dengan tidak meletakkan bayi kontak langsung dengan udara dingin, air, jendela dan kipas angin

Evaluasi : Ibu telah bersedia dan mengerti untuk menjaga kehangatan bayinya

4. Menganjurkan kepada ibu untuk membawa bayi setiap posyandu untuk menerima imunisasi secara teratur sesuai usia bayi

Evaluasi : Ibu bersedia membawa bayi setiap posyandu

III. Kunjungan Neonatal Ke III

Tanggal pengkajian : 09 Maret 2020

Waktu pengkajian : 10.30 Wib

Pengkaji : Chrisnina Sembiring

e. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan tidak ada tanda-tanda kelainan pada bayi
2. Ibu mengatakan bayi dalam keadaan baik
3. Ibu mengatakan masih tetap memberikan ASI Eksklusif

f. Data Objektif (O)

1. Pemeriksaan :

HR : 116x/i

RR : 64x/i

Suhu : 36.6°C

2. Warna kulit : kemerahan

3. Pergerakan : Aktif

4. Refleks

- Refleks Moro : aktif
- Refleks Rooting : aktif
- Refleks Sucking : aktif
- Refleks tonic neck : aktif

5. Tali pusat : Sudah puput

g. Analisa (A)

Bayi baru lahir normal minggu kedua

h. Penatalaksanaan (P)

1. Memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan bayinya, yaitu :

- HR : 116x/i
- RR : 64x/i
- Temp : 36.6°C
- Warna kulit : Kemerahan
- Pergerakan : Aktif

Evaluasi : Ibu telah mengetahui hasil pemeriksaan pada bayinya

2. Mengingatkan kembali kepada ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai berumur 6 bulan hanya mendapatkan ASI tanpa makanan tambahan pada bayi dan memberikan ASI setiap saat dimana bayi membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dan memberikan ASI sesering mungkin pada bayi

Evaluasi : Ibu bersedia untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya.

3. Memberitahukan kepada ibu untuk tetap mencegah kehilangan panas pada bayi dengan tidak meletakkan bayi kontak langsung dengan udara dingin, air, jendela dan kipas angin

Evaluasi : Ibu telah bersedia dan mengerti untuk menjaga kehangatan bayinya

4. Menganjurkan kepada ibu untuk membawa bayi setiap posyandu untuk menerima imunisasi secara teratur sesuai usia bayi

Evaluasi : Ibu bersedia membawa bayi setiap posyandu

E. ASUHAN KEBIDANAN KEBIDANAN PADA AKSEPTOR KB

Tanggal pengkajian : 03 Maret 2020

Waktu pengkajian : 11.30 Wib

Pengkaji : Chrisnina Sembiring

a. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih memberikan ASI eksklusif kepada bayinya
2. Ibu ingin tetap memberikan ASI eksklusif sekaligus menjadi peserta KB MAL

b. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum : baik
2. Tanda-tanda vital :
 - TD : 110/70 mmHg
 - RR : 20x/i
 - HR : 62x/i
 - Suhu : 37°C
3. Pengeluaran ASI : ada (Lancar)
4. Putting susu : menonjol dan tidak lecet

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 akseptor KB metode amenorea laktasi (MAL)

d. Penatalaksanaan (P)

1. Menginformasikan ibu tentang pemeriksaan bahwa keadaan ibu dalam keadaan baik, TTV dalam batas normal yaitu TD:110/70 mmHg, putting susu menonjol dan tidak lecet, pengeluaran ASI lancar dan tidak ada tanda infeksi masa nifas

Evaluasi : Ibu telah mengetahui hasil pemeriksaan

2. Menjelaskan pada ibu tentang keuntungan dan kekurangan dari metode amenorea laktasi dimana keuntungannya tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat dan tanpa biaya. Sedangkan keuntungan untuk bayi mendapat kekebalan tubuh, sumber asupan gizi pada bayi dan keuntungan dari ibu mengurangi perdarahan, resiko anemia dan meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi. Kekurangan dari metode amenorea laktasi ini keefektifitasan rendah, tidak melindungi terhadap PMS termasuk virus hepatitis B dan HIV/AIDS.

Evaluasi : Ibu telah mengetahui keuntungan dan kekurangan kontrasepsi MAL

3. Memberikan pendidikan kesehatan bagi ibu untuk keberhasilan kontrasepsi MAL sangatlah rendah oleh karena itu sebaiknya ibu menyusui secara penuh, bayi menghisap dengan penuh, pola menyusui diberikan secara on demand, hindari jarak menyusui lebih 4 jam sebaiknya bayi disusui sesering mungkin

Evaluasi : Ibu telah mengetahui manfaat pemberian ASI

4. Menganjurkan ibu untuk tetap makan teratur, agar produk ASI tetap lancar dan kebutuhan makanan bayi tetap terpenuhi

Evaluasi : Ibu bersedia untuk makan teratur

5. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan.

Evaluasi : Ibu bersedia untuk memberikan ASI eksklusif

BAB IV

PEMBAHASAN

Setelah penulis melakukan Asuhan Kebidanan Pada Ibu P.S mulai dari kehamilan, Pada ibu M.S saat bersalin, nifas dan bayi baru lahir, di Wilayah Kerja Puskesmas Sarulla Kecamatan Pahae Jae sudah benar dilakukan dengan baik dan kebanyakan sudah mulai sesuai dengan teori/tinjauan pustaka walaupun masih ada kesenjangan. Maka pada bab ini penulis mencoba membahas kesenjangan antara teori dengan kenyataan pada lahan praktek.

A. KEHAMILAN

Asuhan yang diberikan pada ibu saat kehamilan, sebelum memberikan asuhan pada ibu terlebih dahulu dilakukan *informed consent* pada ibu dalam bentuk komunikasi yang baik juga dilakukan penulis terhadap keluarga sehingga saat pengumpulan data ibu bersedia memberikan informasi penting tentang kondisi kesehatannya.

Asuhan yang diberikan pada ibu P.S selama kehamilan sesuai dengan penatalaksanaan asuhan 10 T pada standard pelayanan pada ibu hamil. Ibu P.S. Selama masa kehamilan Ibu P.S melakukan pemeriksaan sebanyak 6 kali di Puskesmas pembantu Onan Joro Kecamatan Pahae Jae yakni kunjungan dilakukan dari trimester I sampai trimester III. Hal ini sesuai dengan kebijakan program kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan sedikitnya 3 kali selama masa kehamilan yaitu minimal dilakukan sekali kunjungan antenatal hingga usia 28 minggu, sekali kunjungan antenatal selama kehamilan 28-36 minggu dan sebanyak dua kali kunjungan pada usia kehamilan di atas 36 minggu (Prawirohardjo 2016; hal 279). Pada ibu P.S terlaksana sesuai dengan teori, klien melakukan pemeriksaan dari trimester I dan setelah trimester III melakukan kunjungan seminggu sekali.

Kehamilan ibu direncanakan, Ibu P.S mengatakan tidak mengharapkan jenis kelamin, ibu berharap kelak bayinya lahir dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Kesimpulan tersebut didapat langsung

dari keterangan Ibu P.S dalam Menjalani masa kehamilannya Ibu P.S sangat memperhatikan kesejahteraan janin dengan mengkonsumsi vitamin dan makan makanan yang telah dianjurkan, serta melakukan pemeriksaan secara rutin.

Pada kunjungan pertama berat badan Ibu P.S yaitu 68 kg, dan pada kunjungan kedua berat badan Ibu P.S 69 kg, pada kunjungan ketiga Ibu P.S 70kg, berat badan Ibu P.S sebelum hamil 58 kg, dan dihitung Ibu P.S mengalami kenaikan berat badan sekitar 10 kg selama hamil, kehamilan dianggap normal sehingga dikatakan tidak ada kesenjangan dengan teori, karena berat badan wanita hamil akan naik kira-kira diantara 6,5-16,5 kg rata-rata 12,5 kg atau dengan kata lain ibu mengalami kenaikan berat badan 0,3kg/minggu. Tinggi badan Ibu P.S 150 cm dan menurut teori itu termasuk tinggi badan yang normal untuk ibu hamil. (Prawirohardjo, 2016: 180; Manuaba, 2017: 110).

Ukuran tekanan Darah (TD). Hal ini juga dilakukan setiap kali ibu melakukan kunjungan. Di dapat hasil bahwa tekanan darah Ibu P.S adalah 110/70 mmHg, sampai dengan 120/70 mmHg, dan dianggap normal, karena umumnya tekanan darah normal 110/70 mmHg sampai 120/80 mmHg (Kemenkes RI, Buku KIA, 2018: hal 01)

Pemeriksaan TFU dilakukan dengan palpasi, dilakukan untuk mengetahui usia kehamilan. Dan didapatkan hasil pada Ibu P.S pada kunjungan pertama yaitu 30 cm, pada kunjungan ke dua 32 cm, pada kunjungan ke tiga 33 cm. nilai ini masih dalam batas normal dengan tafsiran berat janin 3255 gram.

Pemeriksaan DJJ dilakukan rutin setiap kunjungan dan didapat hasil pada kunjungan pertama 132x/m, kunjungan kedua 145x/m, kunjungan ketiga DJJ 132x/m. Teori menjelaskan bahwa DJJ normal dalah 120-160x per menit. Sehingga dapat disimpulkan bahawa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

Imunisasi TT untuk ibu hamil diberikan 2 kali, dengan dosis 0,5 cc disuntikkan secara intramuskuler / subkutan (di bawah otot atau di bawah kulit) . Imunisasi TT harus diberikan sebelum kehamilan 8 bulan untuk mendapatkan imunisasi TT lengkap . Dan Ibu P.S sudah diberikan imunisasi lengkap sebelum usia kehamilan 32 minggu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktek.

Tes laboratorium sederhana yang dilakukan selama perawatan prenatal adalah Hb pemeriksaan untuk menilai status anemia pada wanita hamil. Pada Ibu P.S didapati kadar Hb 11 gr%. Maka Ibu P.S dikatakan tidak anemia. Sesuai dengan teori Ibu hamil dikatakan anemia apabila kadar Haemoglobin (HB) dalam darahnya kurang dari 11 gr% (Kemenkes RI, Buku KIA, 2018: 38).

Tablet penambah darah penting untuk mencukupi kebutuhan zat besi pada kehamilan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jumlah sel darah merah sangat mempengaruhi pada saat persalinan dan nifas. Tablet penambah darah ini dapat diberikan sesegera mungkin setelah rasa mual hilang atau diminum pada malam hari sebelum menjelang tidur yaitu satu tablet Fe sehari dengan menggunakan air putih dan tidak dengan teh, kopi, susu karena dapat menyebabkan penyerapan Tablet Fe tidak efektif pada tubuh ibu hamil. Pada Ibu P.S sesuai dengan teori yaitu mendapatkan tablet Fe sebanyak \pm 90 tablet zat besi pada trimester I dan trimester III.

Glukosa urine dan protein urine dilakukan dengan hasil yang negative. Walaupun tidak ditemukan indikasi seperti odema dan tekanan darah yang melebihi batas normal yang dapat mengarah pada hipertensi kehamilan atau menuju pada preeklamsi.

Temu wicara (konseling) dan Tatalaksana kasus dapat berupa anamnesa, konsultasi dan persiapan rujukan. Anamnesa meliputi biodata, riwayat kesehatan, persalinan dan nifas. Pada ibu P.S konseling ini terlaksana.

B. PERSALINAN

Pada tanggal 26 Februari 2020, pukul 08.38 WIB Ibu M.S datang dengan keluhan mules-mules dan keluar lendir bercampur darah, HPHT pada tanggal 18 Mei 2019 berarti usia kehamilan Ibu M.S pada saat ini berusia 38-40 minggu. Hal ini sesuai antara teori dan kasus dimana dalam teori (Manuaba, 2017; hal 157) menyebutkan persalinan dan kelahiran normal adalah kehamilan cukup bulan proses pengeluaran janin dan uri.

KALA I

Pada kasus Ibu M.S sebelum persalinan sudah ada tanda-tanda persalinan seperti ibu mengeluh mules-mules dan keluar lendir, hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan tanda inpartu seperti adanya penipisan dan pembukaan serviks, kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan serviks dan cairan lendir bercampur darah melalui vagina (Kemenkes RI, Buku KIA, 2018; hal 28-29).

Pada saat pengkajian kala I pada Ibu M.S didapatkan kemajuan persalinan tidak melewati garis waspada pada partograf. Kala I pada Ibu M.S berlangsung selama 7 jam, keadaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan. Hal ini sesuai dengan teori, lamanya kala I berlangsung 14 jam (Mochtar, 2013: Hal 72).

Penatalaksanaan yang diberikan adalah melakukan observasi keadaan umum, tanda-tanda vital, keadaan janin dan kemajuan persalinan. Hal ini dalam memantau keadaan ibu dan janin tanpa menghiraukan apakah persalinan itu normal atau dengan komplikasi.

KALA II

Pada Ibu M.S kala dua berlangsung selama 20 menit. Hal ini sesuai dengan teori. Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai dengan bayi lahir. Pada kala ini his terkoordinir, kuat, cepat dan lebih lama kira-kira 2-3 menit sekali, kepala janin telah turun memasuki ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang menimbulkan rasa mengedan karena tekanan pada rectum, ibu merasa

seperti ingin buang air besar, dengan tanda anus terbuka, kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka dan perineum meregang. Hal ini sesuai dengan teori dalam teori, lama kala dua maksimal pada multipara berlangsung 1 jam dan pada primi 2 jam (Mochtar, 2013: Hal 72-73).

Pada saat kepala lahir tidak dilakukan pemeriksaan lilitan tali pusat dan tidak membersihkan jalan nafas dikarenakan bahu dan seluruh badan bayi langsung keluar, HIS ibu yang ade kuat menyebabkan adanya robekan jalan lahir hingga derajat II. Hal ini tidak sesuai dengan APN yang seharusnya dilakukan pemeriksaan lilitan tali pusat sebelum kepala bayi lahir dan membersihkan jalan nafas setelah bayi keluar dari jalan lahir. Sebagai evaluasi agar bidan melakukan komunikasi yang baik terhadap pasien saat melakukan pertolongan persalinan.

KALA III

Kala III pada Ibu M.S dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta berlangsung selama 10 menit dan tidak lebih dari 30 menit. Adanya tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu uterus yang membesar dan keras (globuler), tali pusat bertambah panjang dan semburan darah. Hal ini sesuai dengan teori (Mochtar, 2013: Hal 73).

KALA IV

Kala IV ini berjalan dengan normal, tidak ada tanda-tanda perdarahan dan uterus berkontraksi dengan baik. Observasi yang dilakukan penolong pada kala IV yaitu Laserasi jalan lahir derajat II, memantau tanda-tanda vital, kontraksi, tinggi fundus, dan pengeluaran pervaginam setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit dalam 1 jam kedua (Prawirohardjo, 2016: Hal 329). Terdapat kesesuaian antara teori dan kasus dimana pada kasus Ibu P.S pemantauan kala IV semua dilakukan dengan baik dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk catatan.

C. NIFAS

Masa nifas (Puerperium) adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil dan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari.

Selama kunjungan masa nifas ibu M.S menjalani masa nifas dengan normal. Kunjungan masa nifas paling sedikit dilakukan sebanyak 3 kali yaitu 6 jam – 3 hari setelah persalinan, hari ke 4 – 28 hari setelah persalinan dan 29 – 42 hari setelah persalinan.

Pada ibu 1 hari postpartum didapati TFU 2 jari dibawah pusat dan pengeluaran lochea rubra dalam batas normal, tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, sudah melakukan perawatan perineum dan tidak ada tanda bahaya masa nifas. Pada kunjungan kedua, 6 hari post partum didapati TFU 3 jari diatas simfisis, tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda bahaya pada ibu nifas dan ibu dalam masa nifas normal. Pada kunjungan ketiga, ibu post partum minggu ke 5 TFU sudah tidak teraba, Luka perineum sudah mengering dan tidak ada tanda-tanda bahaya pada ibu nifas dan dalam masa nifas normal .

D. BAYI BARU LAHIR

Pada pengkajian bayi Ibu M.S diperoleh data bayi baru lahir spontan dengan presentasi kepala pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 16.15 Wib dengan berat badan 3300 gram dan panjang 50 cm pada usia kehamilan ibu 38-40 minggu. Pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan bawaan dan bayi dalam keadaan sehat. Hal ini sesuai dengan teori bahwa bayi baru lahir normal adalah bayi yang dilahirkan dari kehamilan 37-42 minggu dan berat badan lahir dari 2500-4000 gram (Bobak, 2015: 385).

Pelaksanaan IMD pada bayi Ibu M.S terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa upaya untuk menyusui dalam satu jam pertama kelahiran, penting untuk keberhasilan proses menyusui selanjutnya yaitu akan merangsang produksi ASI, serta memperkuat refleks menghisap bayi (Kemenkes RI, Buku KIA, 2018: Hal

30). Refleks menghisap yang pertama ini timbul 20-30 menit setelah lahir (Prawirohardjo, 2016: Hal 369) .

Penatalaksanaan yang diberikan adalah melakukan perawatan bayi baru lahir yaitu membersihkan jalan nafas, memotong tali pusat dan merawat tali pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut (Manuaba, 2017: Hal 196), bahwa tujuan utama perawatan segera setelah bayi lahir ialah membersihkan jalan nafas, memotong tali pusat serta mempertahankan suhu tubuh bayi

Bayi Ibu M.S dimandikan setelah usia 6 jam. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa memandikan bayi dalam beberapa jam pertama setelah bayi lahir akan menyebabkan hipotermi yang sangat membahayakan kesehatan bayi baru lahir. Maka jangan memandikan bayi setidaknya ± 6 jam setelah lahir (Manuaba, 2017: Hal 196). Pada kunjungan hari ke 6 keadaan bayi baik, tali pusat sudah puput.

Pada kunjungan minggu ke 2 keadaan bayi baik dan hasil pemeriksaan diperoleh adanya kenaikan berat badan bayi dan tidak ditemukan adanya masalah pada bayi, ibu hanya memberikan ASI saja tanpa memberikan makanan pendamping ASI dan ASI diberikan setiap saat bayi membutuhkan. (Manuaba, 2017: Hal 198) Hal ini sesuai dengan teori pemenuhan ASI eksklusif dalam 6 bulan pertama dan MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) untuk 6 bulan kedua. Bayi sudah mendapat imunisasi HB0 dan suntik Vit K pada tanggal 26 Februari 2020 setelah persalinan.

E. KELUARGA BERENCANA

Setelah dilakukan informed consent didapatkan Ibu M.S ingin menggunakan KB tanpa alat, dengan alasan Ibu M.S yaitu ingin menyusui, maka dari itu kontrasepsi yang digunakan yaitu KB Metode Amenore Laktasi, dimana MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apa pun. MAL dapat digunakan bila

menyusui secara penuh dan lebih efektif bila pemberian ≥ 8 kali sehari, belum haid dan umur bayi kurang dari 6 bulan. Hal ini sesuai dengan teori dimana Ibu M.S setelah pasca persalinan menggunakan KB tanpa alat dan hanya mengandalkan ASI.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan yang komprehensif pada Ibu P.S dari masa hamil dan Pada ibu M.S saat bersalin, nifas sampai bayi baru lahir, mulai dari tahap pengkajian sampai dengan evaluasi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ibu P.S pada usia kehamilan 34-40 minggu dilakukan secara teratur atau rutin dengan menggunakan standar Asuhan Antenatal Care. Dimana kehamilan Ibu P.S berlangsung normal, keluhan dan rasa ketidaknyamanan pada ibu dapat diatasi dengan baik hingga kehamilan aterm.
2. Proses persalinan Ibu M.S berlangsung normal dan tidak ditemukan komplikasi selama persalinan dan IMD berhasil dilakukan oleh bayi.
3. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi Ibu M.S dilaksanakan sesuai dengan kunjungan neonatus, keadaan umum bayi baik dan bayi tumbuh dengan sehat hingga saat ini masih diberikan ASI eksklusif tanpa ada makanan pendamping ASI. Bayi telah diberikan imunisasi Hepatitis B0 dan suntik Vitamin K.
4. Asuhan kebidanan pada ibu nifas Ibu M.S sesuai dengan standar kunjungan rumah post partum.
5. Asuhan Kebidanan Akseptor KB pada ibu yaitu KB MAL yang berlangsung hingga 6 bulan kedepan, tanpa memberikan bayi makanan tambahan

B. SARAN

1. Bagi Mahasiswi

Mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki untuk melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB di lapangan praktek, sesuai standar kebidanan yang telah ditetapkan sesuai kewenangan dan etika profesi kebidanan.

2. Bagi institusi pendidikan

Memberikan kesempatan untuk mahasiswa memperluas lahan praktek dengan waktu yang cukup sehingga mahasiswa dapat lebih mahir dan terampil dalam melakukan praktek asuhan kebidanan dan lebih banyak lagi mengenal kasus dilapangan khususnya kasus mengenai kebidanan baik yang fisiologis dan patologis.

3. Bagi Pasien

Diharapkan pasien dapat menambah informasi sendiri dan tidak bergantung pada petugas kesehatan mengenai informasi kesehatan khususnya tentang kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana dan juga diharapkan pasien mau lebih mendengarkan arahan atau saran dari petugas kesehatan karena tujuannya untuk mendidik agar tingkat kesehatan ibu dan bayi lebih baik lagi.

4. Bagi bidan di Puskesmas

Diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam pemberian asuhan kebidanan serta mampu memberikan pelayanan secara komprehensif dan continue care.

DAFTAR PUSTAKA

- Bobak, 2015. **Buku Ajar Keperawatan maternitas**. Penerbit Buku Kedokteran EGC : Jakarta.
- Cunningham, 2017. **Obstetri Wiliam edisi 23 Volume 1**. Buku Kedokteran. EGC : Jakarta.
- Dinkes Taput, 2018. **Profil Kesehatan Tapanuli utara**: Tarutung.
- Kemenkes RI, 2018. **Profil Kesehatan Indonesia**: Jakarta.
- RI, 2018. **Buku KIA**: Jakarta.
- RI, 2015. **BPPSDM**: Jakarta.
- Manuaba, Ida Ayu Chandranita. 2017. **Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB**. Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
- Mochtar, Rustam. 2013. **Sinopsis Obstetri Jilid 1**. Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
- 2013. **Sinopsis Obstetri Jilid 2**. Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
- Myles, 2007. **Buku Ajar Bidan**. Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2016. **Ilmu Kebidanan**. Yayasan Bina Pustaka. EGC: Jakarta.
- Saifuddin, 2013. **Ilmu Kebidanan**. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo: Jakarta.
- Varney, Helen. 2008. **Asuhan Kebidanan Vol 1**. EGC: Jakarta.
- 2008. **Asuhan Kebidanan Vol 2**. EGC: Jakarta.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting, KM 13,5 Kel. Lau Cih Tuntungan Kode Pos : 20136

Telepon : 061-8368633 – Fax : 061-8368644

Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



Tarutung, 07 Februari 2020

Bapak/Ibu

No : DM.10.01/00/01.01/70/II/2020
Perihal : Izin Survey Pendahuluan Penyusunan
Laporan Tugas Akhir Pada Tingkat III Sem VI
Prodi DIII Kebidanan Tarutung

Di
Tempat

Dengan hormat,

1. Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tertera dibawah ini mohon diberi izin untuk memperoleh data (data primer maupun sekunder) serta data klien yang akan dijadikan sebagai subjek asuhan pada penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan pada Diploma III Kebidanan yang bertujuan untuk memberikan asuhan komprehensif dan berkesinambungan (*Continuity Of Care*).
2. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Ketua Prodi DIII Kebidanan Tarutung
Poltekkes Kemenkes Medan

Marni Siregar, SST, M.Kes
NIP. 19630904 198602 2 001

**Daftar Nama Mahasiswa Tingkat III Semester VI Prodi DIII Kebidanan Tarutung
Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

NO	NAMA	NIM	NO	NAMA	NIM
1	Anisyah Tambunan	171601	24	Lamtiar Simamora	171624
2	Ayu S. Sihombing	171602	25	Lona M Lumbantobing	171626
3	Christina Br. Sembiring	171603	26	Marina Hutabarat	171627
4	Dahlia Panjaitan	171604	27	Marthaelisa Batubara	171628
5	Devi Kari Siregar	171605	28	Melisa AM Panggabean	171629
6	Dian Novitri Simatupang	171606	29	Monika Br. Tamba	171630
7	Ega Morina Manurung	171607	30	Monika Yohana Nababan	171631
8	Elin Lubis	171608	31	Mya Oktaviana Siburian	171632
9	Elisabet Boang Manalu	171609	32	Nancy M. C. Hutabarat	171633
10	Endriyani H Siburian	171610	33	Nanna Sari Ani Sihite	171634
11	Engely Debora Sinaga	171611	34	Nia Veronika Samosir	171635
12	Erni Yanti E Tumorang	171612	35	Octavia RL Simatupang	171636
13	Ey Virton Siahaan	171613	36	Prima Yanti	171637
14	Fitri Ayu Tampubolon	171614	37	Ronauli Br. Nainggolan	171638
15	Giofanni Marbun	171615	38	Rosmeliana Sormin	171639
16	Golda Aryanty Hutagaol	171616	39	Rugun MI. Sitompul	171640
17	Gracelia M Simanjuntak	171617	40	Samaen Hutabarat	171641
18	Helena M Pangaribuan	171618	41	Sartia N Situmorang	171642
19	Heppy Sibarani	171619	42	Sofhya A Lumbantobing	171643
20	Johanna Hutagalung	171620	43	Sri Siska y Sihombing	171645
21	Jona Justinar Hutabarat	171621	44	Susi Silalahi	171646
22	Junita Nova Hutabarat	171622	45	Theresia Simorangkir	171647
23	Kristin Sinambela	171623	46	Vera Cristin Silalahi	171648

Ketua Prodi DIII Kebidanan Tarutung
Poltekkes Kemenkes Medan



Marni Siregar, SST, M.Kes
NIP. 19630904 198602 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SARULLA
Jln. Sipirok Sarulla Kecamatan Pahae Jae
Email : puskesmas.sarulla@yahoo.com



Sarulla, 10 Februari 2020

Nomor : 445/ 55/ 12.02.06/ II/ 2020
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Surat**

Kepada Yth :
Kepala Prodi DIII
Kebidanan Tarutung
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : DM.10.01/00/01.01/70/II/2020 tanggal 07 Februari 2020
Perihal : Izin Survey Pendahuluan Penyusunan Laporan Tugas Akhir Pada Tingkat III
Semester VI Prodi DIII Kebidanan Tarutung Atas Nama :

Nama : CHRISNINA Br. SEMBIRING
NPM : 171603
Tingkat : III
Semester : VI

Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut dapat kami terima untuk memperoleh data dan melaksanakan asuhan Kebidanan untuk Penyusunan Laporan Tugas Akhir Syarat kelulusan pada Diploma III Kebidanan di Wilayah kerja Puskesmas Sarulla terhitung mulai Bulan Januari s/d Maret 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima Kasih.



Ka. UPT Puskesmas Sarulla
Kecamatan Pahae Jae

dr. Tryana Dermana

NIP. 19790922 200911 2 001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting, KM 13,5 Kel. Lau Cih Tuntungan Kode Pos : 20136

Telepon : 061-8368633 – Fax : 061-8368644

Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



KARTU BIMBINGAN LTA

Nama Mahasiswa : Chrisnina br Sembiring

NIM : 171603

**Judul LTA : Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ibu P.S
Kehamilan, Bersalin, BBL, Nifas Dan KB Di Wilayah Kerja
Puskesmas Sarulla Kecamatan Pahae Jae Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2020**


Pembimbing I : Dimpu R Nainggolan SST, M.Kes

Pembimbing II : Riance Mardiana Ujung SST, M.K.M

No	Tanggal	Uraian Kegiatan Bimbingan	Nama Dosen	Paraf
1	06-01-2020	Bimbingan Proposal BAB I	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
2	08-01-2020	Bimbingan Proposal BAB I dan BAB II	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
3	13-01-2020	Bimbingan Proposal BAB I	Riance Ujung SST, M.K.M	
4	18-01-2020	Bimbingan Proposal BAB II	Riance Ujung SST, M.K.M	
5	20-01-2020	Bimbingan Revisi BAB I dan BAB II	Riance Ujung SST, M.K.M	
6	22-01-2020	Bimbingan BAB III	Riance Ujung SST, M.K.M	
7	24-01-2020	Bimbingan Revisi BAB III	Riance Ujung SST, M.K.M	

8	29-01-2020	Bimbingan Revisi Proposal BAB I	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
9	31-01-2020	Bimbingan Revisi BAB II	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
10	05-02-2020	Bimbingan Revisi BAB II	Riance Ujung SST, M.K.M	
11	10-02-2020	Bimbingan Revisi BAB III	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
12	17-02-2020	Menguji Ujian Proposal	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
13	17-02-2020	Menguji Ujian Proposal	Riance Ujung SST, M.K.M	
14	20-02-2020	Bimbingan Revisi Proposal	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
15	24-02-2020	Bimbingan Revisi Proposal	Riance Ujung SST, M.K.M	
16	27-02-2020	Bimbingan LTA BAB IV	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
17	03-03-2020	Bimbingan LTA BAB IV	Riance Ujung SST, M.K.M	
18	12-03-2020	Bimbingan Revisi LTA BAB IV	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
19	18-03-2020	Bimbingan Revisi LTA BAB IV dan V	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
20	26-03-2020	Bimbingan Revisi LTA BAB IV dan V	Riance Ujung SST, M.K.M	
21	14-04-2020	Menguji Ujian Meja Hijau	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
22	14-04-2020	Menguji Ujian Meja Hijau	Riance Ujung SST, M.K.M	
23	20-04-2020	Bimbingan Revisi LTA	Dimpu Nainggolan SST, M.Kes	
24	24-04-2020	Bimbingan Revisi LTA	Dimpu Nainggolan	

			SST, M.Kes	
25	27-04-2020	Bimbingan Revisi LTA	Riance Ujung SST, M.K.M	



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting, KM 13,5 Kel. Lau Cih Tuntungan Kode Pos : 20136

Telepon : 061-8368633 – Fax : 061-8368644

Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF (INFORMED CONSENT)

PMB/RB/POSKESDES/PUSKESMAS/RS : Puskesmas Pembantu Onan Joro
ALAMAT : Sarulla, Kecamatan Pahae Jae
TELP/NO.HP :
NOMOR REGISTER :

PERSETUJUAN PEMBERIAN ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN, PERTOLONGAN PERSALINAN, ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS, BAYI BARU LAHIR, DAN LAYANAN KB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ibu : Ibu Prisda Sitompul
Umur : 31 tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Silakitang
Telp/Hp : -

Menyatakan bersedia menjadi subjek dalam penyusunan laporan tugas akhir mahasiswa tingkat III semester VI Prodi D-III Kebidanan Tarutung Poltekkes Kemenkes Medan :

Nama Mahasiswa : Chrisnina br sembing
NIM : 171603

Setelah mendapat penjelasan tentang pemberian asuhan kebidanan komprehensif yang diberikan mulai asuhan kebidanan kehamilan trimester III berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sederhana (cek Hb, protein urine, urin reduksi), pertolongan persalinan dengan 60 langkah APN, asuhan kebidanan pada ibu nifas (pemeriksaan fisik), asuhan kebidanan pada bayi baru lahir (pemeriksaan fisik dan pemberian imunisasi) dan pemberian asuhan kebidanan keluarga berencana (konseling dan pemberian tindakan alat kontrasepsi).

Pada saat pemberian asuhan kebidanan dan pemberian tindakan kebidanan, adanya pengambilan foto dan video terhadap subjek. Foto dan video yang diambil tidak disebarluaskan baik di media massa, media elektronik, maupun media sosial tetapi hanya digunakan untuk kepentingan laporan tugas akhir.

Setelah mendapat penjelasan tentang seluruh pemberian asuhan kebidanan yang telah disebutkan diatas dan tentang pengambilan foto dan video, maka saya menyatakan bersedia menjadi subjek LTA untuk mendukung terlaksananya kegiatan LTA dari mahasiswa tersebut diatas yang didampingi oleh bidan pembimbing dan dosen pembimbing yang terhitung mulai tanggal 18 Februari s/d 12 Maret 2020

Persetujuan yang saya berikan tidak termasuk persetujuan untuk prosedur atau tindakan invasif atau operasi atau tindakan yang beresiko tinggi. Jika dikemudian hari, saya memutuskan untuk menghentikan menjadi subjek LTA sebelum tanggal yang telah disepakati berakhir, maka mahasiswa tersebut tidak bertanggung jawab atas hasil yang merugikan saya.

Demikian persetujuan saya perbuat, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat digunakan seperlunya.

Tarutung, 18 Februari 2020

Yang Memberi persetujuan

(Prisda Sitompul)


Bidan pembimbing

Diketahui,

Dosen Pembimbing

(Lenny TB Lumbantobing)

(Dimpu Nainggolan, SST.M.Kes)



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting, KM 13,5 Kel. Lau Cih Tuntungan Kode Pos : 20136

Telepon : 061-8368633 – Fax : 061-8368644

Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF (INFORMED CONSENT)

PMB/RB/POSKESDES/PUSKESMAS/RS : Puskesmas Pahae Julu
ALAMAT : Onan Hasang, Kec. Pahae Julu
TELP/NO.HP :
NOMOR REGISTER :

PERSETUJUAN PEMBERIAN ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN, PERTOLONGAN PERSALINAN, ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS, BAYI BARU LAHIR, DAN LAYANAN KB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ibu : Ibu Misda Situmorang
Umur : 26 tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Peanor-nor
Telp/Hp : -

Menyatakan bersedia menjadi subjek dalam penyusunan laporan tugas akhir mahasiswa tingkat III semester VI Prodi D-III Kebidanan Tarutung Poltekkes Kemenkes Medan :

Nama Mahasiswa : Chrisnina br sembing
NIM : 171603

Setelah mendapat penjelasan tentang pemberian asuhan kebidanan komprehensif yang diberikan mulai asuhan kebidanan kehamilan trimester III berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sederhana (cek Hb, protein urine, urin reduksi), pertolongan persalinan dengan 60 langkah APN, asuhan kebidanan pada ibu nifas (pemeriksaan fisik), asuhan kebidanan pada bayi baru lahir (pemeriksaan fisik dan pemberian imunisasi) dan pemberian asuhan kebidanan keluarga berencana (konseling dan pemberian tindakan alat kontrasepsi).

Pada saat pemberian asuhan kebidanan dan pemberian tindakan kebidanan, adanya pengambilan foto dan video terhadap subjek. Foto dan video yang diambil tidak disebarluaskan baik di media massa, media elektronik, maupun media sosial tetapi hanya digunakan untuk kepentingan laporan tugas akhir.

Setelah mendapat penjelasan tentang seluruh pemberian asuhan kebidanan yang telah disebutkan diatas dan tentang pengambilan foto dan video, maka saya menyatakan bersedia menjadi subjek LTA untuk mendukung terlaksananya kegiatan LTA dari mahasiswa tersebut diatas yang didampingi oleh bidan pembimbing dan dosen pembimbing yang terhitung mulai tanggal 26 Februari s/d 12 Maret 2020

Persetujuan yang saya berikan tidak termasuk persetujuan untuk prosedur atau tindakan invasif atau operasi atau tindakan yang beresiko tinggi. Jika dikemudian hari, saya memutuskan untuk menghentikan menjadi subjek LTA sebelum tanggal yang telah disepakati berakhir, maka mahasiswa tersebut tidak bertanggung jawab atas hasil yang merugikan saya.

Demikian persetujuan saya perbuat, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat digunakan seperlunya.

Tarutung, 26 Februari 2020

Yang Memberi persetujuan

(Misda Situmorang)

Bidan pembimbing

Diketahui,

Dosen Pembimbing

(Rolasta Hutagao)

(Dimpu Nainggolan, SST.M.Kes)

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal :
2. Nama Bidan :
3. Tempat Persalinan :
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindos Rumah Sakit
 Klinik Swasta Lainnya :
4. Alamat tempat persalinan :
5. Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV
6. Alasan merujuk :
7. Tempat rujukan :
8. Pendamping pada saat merujuk :
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Y / T
10. Masalah lain, sebutkan :
11. Penatalaksanaan masalah Tsb :
12. Hasilnya :

KALA II

13. Episiotomi :
 Ya, Indikasi
14. Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
15. Cawat Jatin :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
16. Distosis bahu :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
17. Masalah lain, sebutkan :
18. Penatalaksanaan masalah tersebut :
19. Hasilnya :

KALA III

20. Lama kala III : menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U / m ?
 Ya, waktu : menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan :
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 Ya, alasan :
23. Penanganan tali pusat terkendal ?
 Ya,
 Tidak, alasan :

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Pendarahan
1							
2							

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

24. Masase fundus uteri ?
 Ya,
 Tidak, alasan :
25. Plasenta lahir lengkap (intact) Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
27. Laserasi :
 Ya, dimana :
28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
 Perjahitan, dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan :
29. Atani uteri :
 Ya, tindakan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
30. Jumlah pendarahan : ml
31. Masalah lain, sebutkan :
32. Penatalaksanaan masalah tersebut :
33. Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badan : gram
35. Panjang : cm
36. Jenis kelamin : L / P
37. Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit
38. Bayi lahir :
 Normal, tindakan :
 mengeringkan
 menghangatkan
 rangsang taktil
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspiksia ringan/pucat/biru/lemas/tindakan :
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 rangsang taktil menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan :
39. Cooat bawaan, sebutkan :
40. Hipotermi, tindakan :
 a.
 b.
 c.
39. Pemberian ASI
 Ya, waktu :jam setelah bayi lahir
 Tidak, alasan :
40. Masalah lain,sebutkan :
- Hasilnya :

FORMULIR ISIAN OLEH PENELITI

Nama lengkap

1	Chrisnina br Sembiring
---	------------------------

Alamat (harap ditulis dengan lengkap) :

2	Kota Batam
---	------------

Telp/ Hp/ email/ lain-lain :

3	081375738146 / chrisnina2016@gmail.com
---	---

Nama Institusi Anda (tuliskan beserta alamatnya)

4	Program Studi D-III Kebidanan Tarutung POLKESMED Jl. Raja Toga Sitompul, Siatas Barita, Sumatra Utara, Indonesia
---	---

Judul Penelitian

5	"Asuhan Kebidanan Komprehensif pada ibu P.S Kehamilan, Bersalin, BBL, Nifas dan KB di wilayah kerja Puskesmas Sarulla Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020"
---	--

Subjek yang digunakan pada penelitian :

6	a. Ibu P.S G4P3A0H2 usia kehamilan 24 minggu b. Ibu M.S G2P1A0 Bersalin sampai saat menjadi akseptor Keluarga berencana
---	--

Jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian:

7	2 orang ibu
---	-------------

Ringkasan Rencana Penelitian

8	<p>a. Ibu hamil normal dengan usia kehamilan 24 minggu yang melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Pembantu (PUSTU), dipilih menjadi subjek penelitian berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya, diberikan penjelasan sebelum persetujuan tentang penelitian yang akan dilakukan. Bila subjek setuju, selanjutnya diminta untuk menandatangani informed consent. Selanjutnya, subjek yang setuju diberikan asuhan kebidanan sejak masa hamil 24 minggu sampai aterm dengan kunjungan 3 kali di bawah pengawasan dan bimbingan bidan praktek yang bersangkutan dan dosen pembimbing.</p> <p>b. Ibu bersalin dengan Pertolongan persalinan dilakukan di Puskesmas Pahae Julu di bawah pengawasan dan bimbingan bidan praktek yang bersangkutan dan dosen pembimbing. Selanjutnya diberikan asuhan kebidanan masa nifas dan bayi baru lahir dengan 3 kali kunjungan hingga menjadi akseptor keluarga berencana dengan pengawasan bidan yang bersangkutan dan dosen pembimbing. Hasil asuhan kebidanan yang diberikan disusun dalam bentuk pendokumentasian dengan metode SOAP.</p>
---	---

Tarutung, 2020

Mengetahui,
Pembimbing

Menyatakan
Peneliti,

(Dimpu Nainggolan, SST, M.Kes)
NIP. 19781025 201101 2 003

(Chrisnina br Sembiring)
NIM 17.1603

LAMPIRAN

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA KEHAMILAN NORMAL TERHADAP IBU P. S TAHUN 2020

Tanggal pengkajian : 18-02-2020

Waktu pengkajian : 13.45 WIB

Pengkaji : Chrisnina Sembiring

I. PENGUMPULAN DATA (DATA SUBJEKTIF)

A. IDENTITAS BIODATA

Nama	: Ibu P. S	Nama suami	: Tn A. P
Umur	: 31 tahun	Umur	: 33 tahun
Suku/Bangsa	: Batak/Indonesia	Suku/Bangsa	: Batak/Indonesia
Agama	: Kristen	Agama	: Kristen
Pendidikan	: SD	Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Petani	Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Silangkitang	Alamat	: Silangkitang

B. ANAMNESA (DATA OBJEKTIF)

Pada tanggal: 18-02-2020 Pukul : 13.45 WIB Oleh : Chrisnina S.

1. Alasan kunjungan saat ini : Ingin memeriksa kehamilannya
2. Keluhan utama : Sakit dibagian pinggang
3. Keluhan-keluhan lain :
4. Riwayat menstruasi
 - a. Haid pertama : Usia 17 tahun
 - b. Siklus : 28 hari
 - c. Lamanya : 6-7 hari
 - d. Teratur : Ya
 - e. Banyaknya : 1-2x ganti doek/hari

f. Dismenorrhoe : Tidak ada

5. Riwayat Kehamilan, Persalinan, Nifas, BBL yang Lalu

No	Tgl Lahir/ Umur	Jenis Persalinan	Tempat Persalinan	Penolong	BBL		Komplikasi		Nifas	
					BB	PB	Ibu	Bayi	Laktasi	Keadaan
1	7 tahun	Normal	Puskesmas	Bidan	3,4 kg	49 cm	-	-	ASI s/d 4 bulan	Baik
2	5 tahun 5 bulan	Normal	Puskesmas	Bidan	3,5 kg	48 cm	-	-	ASI s/d 2 tahun	Baik
3	1 hari	Meninggal	Puskesmas	Bidan	3,4 kg	49 cm	-	-	-	-
4	KEHAMILAN SEKARANG									

6. Riwayat kehamilan

- a. HPHT : 21-06-2019
- b. TTP : 28-03-2020
- c. UK : 34 minggu
- d. Kunjungan ANC : 5x di Pustu
- e. Obat yang sering dikonsumsi selama hamil: Tablet Fe, Folavit
- f. Pergerakan anak pertama kali dirasakan : ±16 minggu
- g. Pergerakan anak 24 jam terakhir : Aktif (±10 kali)
- h. Imunisasi Toxoid Tetanus sebanyak:
 - TT I : Diberikan pada kehamilan yang lalu
 - TT II : Diberikan pada kehamilan yang lalu
- i. Keluhan-keluhan yang pernah dirasakan ibu:
 - Rasa lelah : Ada, TM II
 - Mual muntah : Ada, TM I

- Nyeri perut : Tidak ada
 - Panas menggigil : Tidak ada
 - Sakit kepala yang berat : Tidak ada
 - Penglihatan kabur : Tidak ada
 - Rasa nyeri/panas waktu BAK : Tidak ada
 - Rasa gatal pada vulva,vagina dan sekitarnya: Tidak ada
 - Pengeluaran cairan pervaginam : Tidak ada
 - Nyeri, kemerahan, tegang pada tungkai : Tidak ada
 - Oedema : Tidak ada
 - Lain-lain : Tidak ada
- j. Kekhawatiran khusus : Tidak ada
- k. Tanda-tanda bahaya
1. Penglihatan kabur : Tidak ada
 2. Nyeri abdomen yang hebat : Tidak ada
 3. Sakit kepala yang berat : Tidak ada
 4. Pengeluaran cairan pervaginam : Tidak ada
 5. Oedem pada wajah dan ekstremitas atas : Tidak ada
 6. Tidak ada terasa pergerakan janin : Tidak ada
- l. Tanda-tanda persalinan : Tidak ada
- m. Kebiasaan ibu/keluarga yang berpengaruh negative terhadap kehamilannya (merokok, narkoba, alcohol, minum jamu, dll): Ada
- n. Rencana persalinan : Puskesmas
7. Riwayat penyakit yang pernah di derita sekarang/ yang lalu:
- a. Jantung : Tidak ada
 - b. Hipertensi : Tidak ada
 - c. DM : Tidak ada
 - d. Malaria : Tidak ada
 - e. Ginjal : Tidak ada
 - f. Asma : Tidak ada
 - g. Hepatitis : Tidak ada
 - h. HIV/AIDS : Tidak ada

8. Riwayat penyakit keluarga

- a. Jantung : Ada,
- b. Asma : Tidak ada
- c. Hipertensi : Tidak ada
- d. Tuberculosis : Tidak ada
- e. Ginjal : Tidak ada
- f. DM : Tidak ada
- g. Malaria : Tidak ada
- h. HIV/AIDS : Tidak ada
- i. Kembar : Tidak ada

9. Riwayat KB

- a. KB yang pernah digunakan : Implan
- b. Berapa lama : 3 tahun
- c. Keluhan : Tidak ada

10. Riwayat sosial, ekonomi, dan psikologi:

- a. Status perkawinan: Sah, Kawin: 1 kali
- b. Lama menikah: 24 tahun, menikah pertama pada umur: 26 tahun
- c. Kehamilan ini direncanakan/ tidak direncanakan: Direncanakan
- d. Perasaan ibu dan keluarga terhadap kehamilan ibu : Senang
- e. pengambilan keputusan dalam keluarga : Suami dan istri
- f. Tempat petugas kesehatan yang diinginkan untuk membantu persalinan : Puskesmas Sarulla oleh Bidan
- g. Tempat rujukan jika terjadi komplikasi : Rumah Sakit
- h. Persiapan menjelang persalinan :Ada, Perlengkapan bayi, BPJS, biaya, dan transportasi

11. Activity Daily Living

a. Pola makan dan minum

1. Makan

Frekuensi : 3 x sehari

Porsi : 1 piring

- Jenis : Nasi, lauk, sayur dan buah
- Makanan pantangan : Tidak ada
- Perubahan pola makan : Tidak ada
- 2. Minum : Air putih
- Jumlah : ± 6-8 gelas/hari
- b. Pola istirahat
 - a. Siang : ± 1 jam
 - b. Malam : ± 6-7 jam
 - c. Keluhan : Tidak Ada
- c. Pola eliminasi
 - 1. BAK : ± 6-7 kali/hari, warna: Jernih
 - Keluhan : Tidak Ada
 - 2. BAB : ± 1 kali/hari, warna: kuning kecoklatan
 - Konsistensi BAB : Lunak
 - Keluhan : Tidak Ada
 - 3. Personal hygiene
 - a. Mandi : 1 x sehari
 - b. Keramas : 2 x/minggu
 - c. Ganti pakaian dalam: 2-3 x sehari
 - 4. Aktivitas:
 - 1. Pekerjaan sehari-hari : Mengurus rumah tangga
 - 2. Keluhan : Mudah lelah dan capek
 - 3. Hubungan seksual : Tidak pernah lagi setelah TM III

II. DATA OBJEKTIF

1. Pemeriksaan umum

- a. Status emosional : Normal
- b. Postur Tubuh : Baik
- c. Keadaan Tubuh : Baik
- d. Kesadaran : Compos mentis

e. Tanda-tanda vital

TD : 110/70 mmHg RR : 20 x/i
HR : 72 x/i Temp : 36,8°C

f. Pengukuran TB dan BB

BB sekarang : 68 kg
BB sebelum hamil : 60 kg
Kenaikan BB setelah hamil : 8 kg
TB : 150 cm
LILA : 29 cm

2. Pemeriksaan fisik

a. Kepala

Kulit kepala : Bersih, tidak ada benjolan
Rambut : Lebat, berwarna hitam dan tidak bercabang

b. Muka

Pucat : Pucat
Oedem : Tidak Oedem
Cloasma gravidarum : Tidak Ada

c. Mata

Congjunctiva : Merah Muda
Sclera : Putih Jernih
Oedem Palpebra : Tidak ada

d. Hidung

Pengeluaran : Tidak ada
Polip : Tidak ada

e. Telinga

Simetris : Ya
Serumen : Tidak ada
Pengeluaran : Tidak Ada
Kelainan pendengaran: Tidak Ada

f. Mulut

Lidah : Bersih

- Bibir
- Pucat/ tidak : Tidak ada
- Pecah-pecah/ tidak : Tidak ada
- Gigi
- Berlobang : gigi atas/bawah : Tidak ada
gigi sebelah kiri/kanan : Tidak ada
- Epulis : Tidak ada
- Ginggivitis : Tidak ada
- Tonsil : Tidak ada
- g. Leher
- Luka bekas operasi : Tidak ada
- Pembengkakan kelenjar tyroid : Tidak ada pembengkakan
- Pembengkakan pembuluh limfe : Tidak ada pembengkakan
- h. Telinga
- Simetris : Ya
- Serumen : Ada, dalam batas normal
- Pemeriksaan pendengaran : Tidak Ada
- i. Mammae
- Simetris : Ya
- Aerola mammae : Hiperpigmentasi
- Putting susu : Menonjol
- Benjolan : Tidak ada
- Pengeluaran kolostrum : Ada
- j. Aksila
- Pembesaran kelenjar getah bening: Tidak ada
- k. Abdomen
- Pembesaran : Sesuai usia kehamilan
- Linea/striae : Nigra/Albicans
- Bekas luka operasi : Tidak ada
- Pergerakan janin : Aktif

1. Pemeriksaan khusus/ Status Present

a. Palpasi Abdomen

Leopold I : Dibagian fundus ibu teraba bulat lembek dan tidak melenting (bokong) TFU : 30 cm

Leopold II : Abdomen sebelah kanan ibu teraba keras memanjang, memapan (punggung) Abdomen sebelah kiri ibu teraba bagian kecil janin (ekstremitas)

Leopold III : Bagian terbawah janin teraba keras, bulat, melenting (kepala)

Leopold IV : Bagian terbawah belum masuk PAP (konvergen)

TBBJ : $(30-13) \times 155 = 2635$ gram

Auskultasi : DJJ: 132 x/i

2. Pemeriksaan panggul luar

a) Distansia spinarum : Tidak dilakukan

b) Distansia kristarum : Tidak dilakukan

c) Konjugata eksterna : Tidak dilakukan

d) Lingkar panggul : Tidak dilakukan

3. Pemeriksaan ketuk/pinggang

Nyeri/ tidak : Tidak ada

4. Pemeriksaan ekstremitas

Atas

Jumlah jari tangan : Lengkap

Oedem/ tidak : Tidak Ada

Bawah

Jumlah jari kaki : Lengkap

Oedem/tidak : Tidak Ada

Varices : Tidak Ada

Refleks Patella : Aktif

5. Pemeriksaan Genetalia

Vulva : Tidak ada

- | | |
|----------------|-------------|
| Pengeluaran | : Tidak ada |
| Kemerahan/lesi | : Tidak ada |
6. Pemeriksaan penunjang
- | | |
|---------------|-------------------|
| Urine Protein | : Tidak dilakukan |
| HB | : Tidak dilakukan |

II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA MASALAH DAN KEBUTUHAN

Diagnosa kebidanan

Ibu G4P3AOH2 usia kehamilan 34 minggu kehamilan normal

Data Dasar

Data Subjektif

- Ibu mengatakan ini kehamilan keempat dan tidak pernah abortus
- Ibu mengatakan HPHT : 21-06-2019
- Ibu mengatakan adanya gerakan janin $\pm 9-10$ x/hari
- Ibu mengatakan bagian abdomen yang paling sering dirasa bergerak adalah disebelah kiri
- Ibu mengatakan sakit punggung bagian bawah

Data Objektif

- Pemeriksaan TTV dalam keadaan normal
- Pemeriksaan Fisik

Berat badan saat hamil	: 68 kg
Konjungtiva	: Merah muda
LILA	: 29 cm
Puting susu	: Menonjol
Varices	: Tidak ada
- Palpasi abdomen

Leopold I	: Bokong janin, TFU : 30 cm
Leopold II	: Kanan : Punggung janin Kiri : Ekstremitas
Leopold III	: Kepala janin
Leopold IV	: Konvergen

TBBJ : (30-13) x155 = 2635 gram

d. Pemeriksaan Laboratorium

Haemoglobin : 11 gr%

Urin Protein : Negatif

Urin Glukosa : Negatif

Data Objektif

- Keadaan umum ibu baik
- Vital sign : tekanan darah 110/70 mmHg, pernafasan :20x/i, nadi: 72 x/i, suhu : 36,8°c
- Palpasi abdomen
- Leopold I : bagian teratas janin teraba bulat, lembek dan tidak melenting (bokong) TFU 30 cm
- Leopold II : bagian punggung janin berada di sebelah kanan abdomen (PUKA) Dan bagian ekstremitas janin berada di sebelah kiri abdomen (PUKI)
- Leopold III : bagian terbawah janin ibu teraba bulat, keras, melenting (kepala)
- Leopold IV : bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul (Konvergen).

B. MASALAH

- Sakit dibagian Pinggang

C. KEBUTUHAN

Penkes ketidaknyamanan TM III

III. ANTISIPASI MASALAH POTENSIAL

Tidak Ada

IV. TINDAKAN SEGERA

Tidak Ada

V. PERENCANAAN

1. Beritahu hasil pemeriksaan pada ibu
2. Beritahu ibu perubahan fisiologis pada trimester III
3. Jelaskan nutrisi yang baik untuk produksi ASI ibu

4. Ingatkan ibu tanda-tanda persalinan kembali.
5. Ingatkan ibu untuk mengonsumsi tablet Fe secara teratur
6. Beritahu ibu tanda bahaya kehamilan trimester III
7. Menjelaskan KIE tentang persiapan persalinan
8. Anjurkan ibu KB dan menjelaskan jenis-jenis KB
9. Beritahu ibu untuk kunjungan ulang

VI. PELAKSANAAN

1. Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa keadaan ibu dan janin dalam keadaan normal. tekanan darah: 110/70 mmHg, Kenaikan Berat badan saat hamil: 8 kg, LILA: 29 cm, UK: 34 minggu, TTP: 28 Maret 2020, serta keadaan janin sehat dan DJJ: dalam batas normal, letak janin normal, TBBJ : 2635 gram,
2. Memberitahukan pada ibu, untuk mengurangi beraktifitas yang berat maka ibu dianjurkan untuk istirahat yang cukup dan mengurangi pekerjaan aktivitas sehari-hari yang memungkinkan sakit pada pinggang ibu.
3. Menjelaskan nutrisi untuk memenuhi Produksi ASI, yaitu menganjurkan ibu banyak minum dan banyak mengonsumsi protein, contohnya; ikan, telur, tahu dan kedelai serta kalsium, seperti susu, keju, dll yang dimana dapat memperlancar ASI ibu
4. Mengingatkan ibu tentang tanda-tanda persalinan yaitu keluarnya lendir bercampur darah dari vagina ibu, dan adanya kontraksi yang beraturan dan semakin sering.
5. Memberikan ibu tablet fe untuk memenuhi kebutuhan zat besi untuk mencegah anemia selama hamil, dengan aturan minum sehari 1 kali minum pada malam hari dengan air putih.
6. Memberitahu ibu tanda bahaya yang dapat terjadi pada trimester III kehamilan yaitu penglihatan kabur, pusing, sakit kepala berlebihan, bengkak pada tangan dan kaki, perdarahan tiba-tiba, pergerakan janin berkurang, pengeluaran cairan dari vagina, demam dan kejang

7. Menjelaskan KIE pada ibu tentang persiapan menjelang persalinan:
 - a. Persiapan perlengkapan pakaian ibu
 - b. Persiapan perlengkapan pakaian bayi
 - c. Tempat dan penolong persalinan : menganjurkan ibu untuk menentukan tempat bersalin dan siapa yang akan menjadi penolong persalinan nantinya
 - d. Pendamping persalinan : Untuk memberikan dukungan pada saat persalinan
 - e. Biaya persalinan : menganjurkan ibu untuk mempersiapkan dana untuk persalinan dan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi
 - f. Transportasi : mendiskusikan persiapan transportasi yang akan digunakan membawa ibu saat bersalin
8. Menganjurkan ibu untuk menjadi akseptor KB dan menjelaskan jenis-jenis KB yang dapat ibu gunakan
9. Memberitahu ibu untuk kunjungan ulang 2 minggu lagi atau kunjungan ulang jika ada keluhan.

VII. EVALUASI

1. Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan
2. Ibu sudah mengetahui cara mengatasi sakit pinggang pada ibu.
3. Ibu akan mengonsumsi makanan yang dapat membantu produksi ASI serta meminum air putih yang banyak
4. Ibu sudah lebih tenang untuk menghadapi persalinannya.
5. Ibu telah mengetahui tanda-tanda persalinan
6. Ibu telah mengerti tentang tanda bahaya pada trimester III
7. Ibu telah mengetahui tentang persiapan persalinan
8. Ibu telah mengetahui jenis-jenis KB dan akan menjadi akseptor KB
9. Ibu bersedia untuk kunjungan ulang atau jika ada keluhan lain

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA
PERSALINAN NORMAL TERHADAP IBU M.S
TAHUN 2020**

Tanggal Pengkajian : Kamis, 27 Februari 2020
Nama Mahasiswa : Chrisnina Sembiring
NPM : 17.1603

A. PENGKAJIAN DATA

1. DATA SUBJEKTIF

a). Identitas pasien	b). Identitas Penanggung Jawab
Nama : Ny. M.S	Nama : Tn. J.S
Umur : 26 Tahun	Umur : 28 tahun
Agama : Kristen	Agama : Kristen
Pendidikan : SMA	Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani	Pekerjaan : Petani
Alamat : Peanornor	Alamat : Peanornor

2. Alasan ke klinik : Ingin Bersalin

3. Keluhan datang : Terasa mules, ada lendir yang bercampur darah

4. Riwayat kesehatan

a). Riwayat kesehatan sekarang

Ibu mengatakan tidak ada riwayat kesehatan sekarang

b). Riwayat kesehatan dahulu

Ibu mengatakan tidak ada riwayat kesehatan dahulu

c). Riwayat penyakit keluarga

Ibu mengatakan ada riwayat Hipertensi pada orantua pasien (Ibu)

5. Riwayat Perkawinan

Nikah 1 kali, umur istri menikah pertama kali 22 tahun, dan umur suami menikah pertama kali 25 tahun

Lama pernikahan 3 tahun.

6. Riwayat Obstetri

a) Riwayat Menstruasi

Ibu mengatakan pertama kali haid yaitu pada umur 16 tahun, lamanya \pm 4 hari, siklusnya teratur yaitu 35 hari, dan ganti doek sebanyak 1-2 kali/hari

b) Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu

Ibu G2P1A0 anak pertamanya sudah berumur 7 tahun, dengan usia kehamilan aterm, dengan persalinan normal, di tolong oleh bidan di puskesmas, Berat Badan Bayi Baru Lahir 3.500 gr, Panjang Bayi 49 cm, Laktasi : Ibu memberikan ASI dan susu formula sebagai makanan tambahan kepada bayi sampai umur 4 bulan, setelah itu bayi dilanjutkan dengan susu formula, serta nasi yang di giling.

c) Riwayat Kehamilan

Ibu mengatakan HPHT tanggal 18 Mei 2019, sehingga dapat di tafsirkan bahwa persalinan ibu yaitu tanggal 25 Februari 2020, dimana usia kehamilan saat ini yaitu 39 minggu 4 hari

d) Obat-obatan yang biasa dikonsumsi

Ibu mengatakan mengkonsumsi tablet tambah darah (Fe) dan TM I, TM II mengkonsumsi vitamin byolisin selama kehamilan ini.

e) Imunisasi TT

Ibu mengatakan sudah mendapat imunisasi TT pada kehamilan sebelumnya 2 kali dan mendapat TT 1 kali pada kehamilan sekarang.

f) Keluhan-keluhan yang pernah dirasakan ibu

ibu mengatakan bahwa keluhan yang dirasakan ibu pada Trimester I yaitu Mual Muntah, Trimester II yaitu merasa lelah, Trimester III sakit pada daerah pinggang.

g) Pergerakan janin

pergerakan janin pertama kali dirasakan ibu yaitu pada usia 16 minggu yaitu sebanyak \pm 10 x/hari.

h) Pola Makan

Ibu mengatakan makan 3x sehari dengan porsi 1 ½ piring dengan jenis makanan yang di masak secara bervariasi.

i) Pola Minum

Ibu mengatakan minum sebanyak ±7-9 gelas sehari.

j) Pola istirahat

Ibu mengatakan istirahat siang yaitu ½ jam dan pada malam hari yaitu 6-8 jam

k) Pola eliminasi

Ibu mengatakan BAB sebanyak ±1 kali sehari dengan konsistensi lunak berwarna kuning kecoklatan dan tidak ada bercampur darah, BAK sebanyak ±6-8 kali sehari

l) Personal Hygiene

Ibu mengatakan mandi 1 kali/sehari, gosok gigi 2 kali/hari, keramas 2 kali/minggu dan ganti pakaian dalam sebanyak 2-3 kali/ hari.

m) Kontrasepsi yang digunakan sebelumnya

Ibu mengatakan selama ini menggunakan KB MAL *metode amenore laktasi*

n) Riwayat kesehatan

Ibu mengatakan tidak mempunyai penyakit menahun, menular dan menurun

o) Riwayat sosial

Ibu mengatakan kehamilan ini direncanakan status pernikahan sah, dan respon keluarga terhadap kehamilan senang, pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.

B. ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU BERSALIN

Pada tanggal 26 February 2020, pukul 08.00 WIB Ibu M.S umur 26 tahun G2P1A0 hamil 38-40 minggu ibu datang ke Puskesmas Onan Hasang, Pahae Julu dengan keluhan keluar lendir bercampur darah dari kemaluan ibu, pinggang terasa panas dan pegal mulai dari perut ke punggung, perut terasa mules mulai pukul 05.00 WIB.

1. Asuhan Kala I Persalinan

Tanggal : 26 February 2020

Pukul : 08.18 WIB

a. Data Subjektif (S)

- 1) Perut panas pegal mulai dari pinggang hingga ke perut
- 2) Perut mulai terasa sakit pukul 05.00 WIB
- 3) Keluar lendir bercampur darah dari kemaluan

b. Data Objektif (O)

- 1) Keadaan Umum : Baik
- 2) TTV :
 - Tekanan Darah : 110/80 mmHg
 - Suhu : 36,6°C
 - Denyut Nadi : 72x/i
 - Pernafasan : 18x/i
- 3) Kontraksi / his : 3x10 menit
 - Lamanya : ≤ 20 detik
- 4) Leopold I : Teraba lembek, bulat dan tidak melenting (Bokong)
 - TFU: 33 cm
 - Leopold II : - Abdomen sebelah kanan ibu teraba keras memanjang, memapan (punggung)
 - Abdomen sebelah kiri ibu teraba bagian kecil janin (ekstremitas)
 - Leopold III : Teraba bulat, keras dan melenting (Kepala)
 - Leopold IV : Sudah memasuki PAP (Divergen)
- 5) TBBJ : (33-12) x 155 = 3255 gram

- 6) DJJ : 142x/i
- 7) Pemeriksaan dalam :
 - Pembukaan : 3 cm
 - Penurunan kepala : 4/5 (Hodge II)
 - Posisi : UUK kanan depan
 - Ketuban : utuh

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 inpartu kala I fase laten

d. Penatalaksanaan (P)

- 1) Memberitahukan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan ibu dan janin saat ini dalam kondisi yang baik, tanda-tanda vital ibu normal, TD: 110/70 MmHg, Hr: 72 x/l, RR: 18 x/l, Suhu: 36,5°C pembukaan 3 cm, kontraksi 3x10 menit durasi 20 detik, DJJ 142x/i.

Evaluasi : ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaannya bahwa keadaan ibu dan janin dalam keadaan sehat

- 2) Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi ringan seperti berjalan-jalan, goyang kanan/kiri serta mengajarkan ibu memakai Gym Ball agar mempercepat pembukaan serviks dan penurunan kepala janin.

Evaluasi : ibu bersedia untuk melakukan mobilisasi ringan agar mempercepat penurunan kepala janin dan pembukaan serviks.

- 3) Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan ibu seperti memberikan roti dan teh manis sebagai sumber tenaga pada saat meneran.

Evaluasi : ibu sudah mengkonsumsi sebungkus biskuit dan segelas teh manis

- 4) Menjelaskan kepada ibu agar jangan gelisah, ketakutan, dan cemas karena tidak lama lagi bayi dalam kandungan ibu akan lahir.

Evaluasi : ibu semakin semangat menunggu kelahiran bayinya

5) Mengajarkan dan mengajarkan kepada keluarga untuk mengusap daerah punggung ibu pada saat kontraksi uterus sehingga dapat mengurangi rasa sakit dan memberikan rasa nyaman pada ibu.

Evaluasi : keluarga telah mengetahui dan dapat mempraktekkan cara untuk mengurangi rasa sakit dan memberikan rasa nyaman pada saat kontraksi uterus dengan mengusap pada daerah punggung ibu

6) Menanyakan kepada ibu siapa yang akan menemani / mendampingi ibu pada saat persalinan nanti.

Evaluasi : ibu ingin didampingi oleh suaminya

Data perkembangan

Tanggal : 26 February 2020

Pukul : 12.55 WIB

a. Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan perut semakin mulas semakin sering dan teratur, nyeri pada pinggang sampai ke perut bagian bawah ibu
- 2) Ibu mengatakan ada keluar lendir bercampur darah dari kemaluan

b. Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum: Baik
- 2) TTV :
 - a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg
 - b. Suhu : 36,8° C
 - c. Denyut Nadi : 74x/i
 - d. Pernafasan : 20x/i
- 3) Kontraksi / his : 4x10 menit
Lamanya : 40 detik

Leopold I : Teraba lembek, bulat dan tidak melenting (Bokong)

TFU: 32 cm

Leopold II : - Abdomen sebelah kanan ibu teraba keras memanjang, memapan (punggung)

- Abdomen sebelah kiri ibu teraba bagian kecil janin

(ekstremitas)

Leopold III : Teraba bulat, keras dan melenting (Kepala)

Leopold IV : Sudah memasuki PAP (Divergen)

- 4) TTBJ : $(32-11) \times 155 = 3255$ gram
- 5) DJJ : 146x/i
- 6) Pemeriksaan dalam
 - Pembukaan : 7 cm
 - Penurunan kepala : 3/5 (Hodge II)
 - Posisi : UUK kanan depan
- 7) Ketuban : Utuh

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 inpartu kala I fase aktif dilatasi maksimal

d. Penatalaksanaan (P)

1. Memberitahu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan ibu dan janin saat ini dalam kondisi yang baik, tanda-tanda vital normal yaitu 120/80 mmHg, Suhu: 36,8° C, HR: 74x/l, RR: 20x/l, pembukaan 7 cm, ketuban utuh
Evaluasi : ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaannya
2. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi ringan seperti berjalan-jalan dan apabila ibu sudah lelah ibu dapat tidur miring kiri dan kanan untuk mempercepat penurunan kepala bayi.
Evaluasi : ibu sudah mau melakukan mobilisasi ringan seperti berjalan-jalan, tidur miring kiri dan kanan dan ibu berharap pembukaannya semakin bertambah
3. Menganjurkan kembali kepada keluarga untuk mengusap pada daerah punggung ibu pada saat kontraksi uterus sehingga dapat mengurangi rasa sakit.
Evaluasi : keluarga telah mengetahui dan dapat mempraktekkan cara untuk mengurangi rasa sakit pada saat kontraksi uterus dengan mengusap pada daerah punggung ibu

4. Mempersiapkan alat dan perlengkapan persalinan, obat-obatan esensial, larutan desinfektan, wadah plasenta, dan tempat sampah serta ruangan yang nyaman dan bersih untuk proses persalinan.
Evaluasi : alat, bahan, perlengkapan, dan ruangan telah dipersiapkan
5. Memberitahu dan menjelaskan posisi yang nyaman kepada ibu saat meneran seperti posisi berdiri, merangkak, jongkok, maupun posisi terlentang dengan kaki ditekuk ke arah paha ibu dan memperbolehkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman pada saat meneran.
Evaluasi : ibu sudah mengetahui posisi yang nyaman saat meneran dan memilih posisi berbaring dengan posisi kaki ditekuk ke arah paha ibu
6. Mengajarkan ibu cara meneran yang baik pada saat terjadi kontraksi yaitu kedua tangan berada di pangkal paha ibu, pandangan ke arah perut ibu, dagu menyentuh dada, tidak mengeluarkan suara dan tidak menutup mata pada saat meneran, meneran sesuai dengan anjuran penolong persalinan.
Evaluasi : ibu sudah mengetahui dan dapat mempraktikkan teknik meneran yang benar dan akan meneran sesuai dengan teknik yang telah diajarkan oleh petugas kesehatan
7. Mengajarkan ibu teknik pernafasan yang benar yaitu ibu dianjurkan untuk tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut, tidak meneran saat kepala bayi sudah lahir tetapi menganjurkan ibu untuk meniup ke arah perut ibu atau bernafas cepat sampai seluruh tubuh bayi lahir.
Evaluasi : ibu sudah mengetahui dan dapat mempraktikkan teknik pernafasan yang benar yang telah diajarkan oleh petugas kesehatan
8. Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf mulai dari penghitungan DJJ setiap 30 menit, pemeriksaan air ketuban, pembukaan serviks dan penurunan kepala setiap 4 jam,

kontraksi uterus setiap 30 menit, tekanan darah setiap 4 jam, nadi setiap 30 menit, suhu setiap 4 jam.

Evaluasi : telah dilakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf oleh petugas kesehatan yaitu

- a) Pukul 12.55 WIB : DJJ 146x/i, air ketuban utuh, penyusupan 0, pembukaan serviks 7 cm, penurunan kepala 3/5 (Hodge II), kontraksi uterus 4x10 menit durasi 40 detik, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 74x/i, suhu 36,8°C dan pernafasan 20x/i
- b) Pukul 15.35 WIB : DJJ 142x/i, air ketuban jernih, penyusupan 0, pembukaan serviks 10 cm, penurunan kepala 1/5 (Hodge IV), kontraksi uterus 5x10 menit durasi 45 detik, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 78x/i, dan suhu 37°C.

2. Asuhan kala II Persalinan

Tanggal : 26 February 2020

Pukul : 15.55 WIB

a. Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan perut mules dan semakin sering
- 2) Ibu mengatakan seperti ingin BAB

b. Data Objektif (O)

- 1) Anus membuka
- 2) Perineum menonjol
- 3) Tampak kepala 5-6 cm di depan vulva
- 4) Pemeriksaan dalam : pembukaan serviks lengkap, ketuban jernih, penurunan kepala 0/5 (Hodge IV), posisi UUB kanan depan, dan presentasi kepala.
- 5) DDJ : 144x/i
- 6) Kontraksi 5x10'45"
- 7) Palpasi abdomen tidak terdapat janin kedua

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 inpartu kala II persalinan

d. Penatalaksanaan (P)

- 1) Menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan ibu dan janin pada saat ini baik, pembukaan sudah lengkap dan membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai dengan keinginannya..

Evaluasi : ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaannya dan bertambah semangat untuk memulai meneran agar dapat segera melahirkan bayinya dengan memilih posisi berbaring sambil kedua kaki ditekuk ke arah paha ibu

- 2) Penolong persalinan menggunakan alat perlindungan diri seperti mitela, masker, celemek, dan sarung tangan steril.

Evaluasi : penolong telah memakai lat perlindungan diri

- 3) Meletakkan kain sarung di atas perut dan di bokong ibu sambil mempersiapkan pakaian bayi.

Evaluasi : Penolong telah meletakkan kain di atas perut dan di bawah bokong ibu serta telah mempersiapkan pakaian bayi

- 4) Menganjurkan ibu untuk meneran jika ada his dan beristirahat di luar his.

Evaluasi : ibu sudah mengetahui dan mau untuk melakukannya yaitu meneran pada saat his dan beristirahat di luar his

- 5) Memimpin persalinan normal pada ibu yaitu :

- a) Melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan yang lain di kepala bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meniup perlahan-lahan kearah perut ibu atau bernapas cepat saat kepala lahir.

Evaluasi : kepala telah tampak di depan vulva dengan diameter 5-6 cm, tangan kanan menahan perineum dengan menggunakan kain bersih sementara tangan kiri menahan di

atas kepala bayi agar tidak terjadi defleksi tiba-tiba, kepala bayi segera lahir

- b) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi.

Evaluasi : telah dilakukan pemeriksaan lilitan tali pusat dan tidak didapati lilitan tali pusat pada leher bayi

- c) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Evaluasi : kepala bayi telah melakukan putar paksi luar

- d) Menempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu bayi lahir, kemudian lahirlah berturut-turut badan bayi yaitu ekstremitas atas bayi, bokong bayi, ekstremitas bawah bayi.

- e) Mengeringkan bayi dengan menggunakan kain bersih dan menjaga kehangatan bayi agar terhindar dari hipotermi.

Evaluasi : bayi telah dikeringkan dan kehangatan bayi telah terjaga

- f) Segera mengganti kain basah dengan kain kering dan bersih bungkus badan bayi dengan kain bersih dan melakukan IMD dengan posisi kepala bayi berada di kedua belah payudara ibu dan badan tengkurap diatas perut ibu (posisi turtle) dan melakukan Bounding attachment.

Evaluasi : IMD dan Bounding attachment telah dilakukan

- g) Melakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat dengan cara menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm

dari pusat bayi dan mendorong isi tali pusat ke arah ibu, melakukan pengguntingan tali pusat.

Evaluasi : telah dilakukan pemotongan tali pusat

h) Melakukan Palpasi perut ibu untuk memastikan apakah ada bayi kedua

Evaluasi : tidak ada bayi kedua pada perut ibu

i) Memberikan suntikkan vitamin K1 1mg intramuscular, dipaha kiri anterolateral setelah IMD

Evaluasi : Vitamin K1 1mg sudah diberikan pada Bayi

j) Memberikan suntikkan Hepatitis B0 0,5 ml, intramuscular, dipaha kanan anterolateral, diberikan kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1

Evaluasi : Hepatitis B0 0,5 ml sudah diberikan pada bayi

3. Asuhan Kala III Persalinan

Tanggal : 26 February 2020

Pukul : 16.20 WIB

a. Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan masih sangat lelah
- 2) Ibu mengatakan perut terasa mules

b. Data Objektif (O)

- 1) Kontraksi uterus ada
- 2) Tinggi fundus uterus setinggi pusat
- 3) Belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 inpartu kala III

d. Penatalaksanaan (P)

- 1) Melakukan Manajemen Aktif Kala III yaitu :
 - a) Penyuntikan Oksiton 10 IU. Beritahu ibu akan disuntikkan oksitosin 10 IU secara IM di bagian paha distal lateral untuk melahirkan plasenta.

Evaluasi : ibu bersedia dan telah dilakukan penyuntikan oksitosin 10 IU dibagian 1/3 atas paha kanan ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu.

- b) Peregangan Tali Pusat Terkendali. Pindahkan klem 5-6 cm di depan vulva. Setelah uterus berkontraksi dengan baik, lakukan penegangan tali pusat terkendali jika terdapat tanda – tanda pelepasan plasenta yaitu adanya semburan darah, tali pusat semakin panjang dan uterus globular, tegangkan tali pusat dengan menggunakan tangan kanan ke arah bawah sejajar lantai sambil tangan kiri mendorong uterus ke arah belakang atas (dorso kranial) secara perlahan-lahan.

Evaluasi : telah dilakukan peregangan tali pusat terkendali

- c) Setelah plasenta tampak di depan vulva, jemput plasenta dengan kedua tangan, dan untuk melahirkan selaput plasenta lakukan teknik memilin secara perlahan untk menghindari robekan pada selaput plasenta

Evaluasi : plasenta telah lahir

- d) Masase Fundus Uterus. Lakukan masase pada fundus uterus selama 15 detik sehingga uterus berkontraksi dengan baik.

Evaluasi : telah dilakukan masase fundus sehingga uterus dapat berkontraksi dengan baik

- 1) Menilai kelengkapan plasenta yaitu dari pemeriksaan sisi maternal, sisi fetal, dan panjang tali pusat.

Evaluasi : plasenta lahir lengkap dengan hasil berat plasenta \pm 500 gram, panjang tali pusat \pm 48 cm, jumlah kotiledon 18 buah, diameter \pm 18 cm, insersi sentralis, dan selaput ketuban utuh

- 2) Mengobservasi jumlah perdarahan

Evaluasi : telah diobservasi jumlah perdarahan yaitu \pm 150 cc

- 3) Memeriksa robekan jalan lahir pada perineum dan vagina.

Evaluasi : obekan jalan lahir

- 4) Membersihkan bokong ibu dan membantu ibu untuk memakai doek serta mengganti pakaian ibu.

Evaluasi : ibu telah dibersihkan dan baju ibu telah diganti

4. Asuhan Kala IV Persalinan

Tanggal : 26 February 2020

Pukul : 16.30 WIB

a. Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan masih sangat kelelahan setelah bersalin.
- 2) Ibu merasakan senang dengan kelahiran bayinya
- 3) Ibu mengatakan ingin minum

b. Data Objektif (O)

- 1) Manajemen kala III sudah dilakukan
- 2) Kontaksi uterus ibu sudah baik
- 3) TFU 1 jari dibawah pusat
- 4) Plasenta lahir lengkap
- 5) Lochea rubra
- 6) Terdapat robekan jalan lahir derajat II

c. Analisa (A)

Ibu P2A0 inpartu kala IV

d. Penatalaksanaan (P)

1. Ada tanda-tanda plasenta lahir :
Adanya semburan darah tiba-tiba, tali pusat memanjang, bentuk uterus berubah dari diskoid menjadi globuler
2. Mengevaluasi laserasi pada perineum dan vagina, Meninjau jumlah perdarahan selama kala IV dan melakukan vulva hygiene serta ganti pakaian dalam dengan doek yang bersih.
Evaluasi : Ada robekan jalan lahir dan sudah dijahit, perdarahan dalam batas normal.
3. Memeriksa keadaan ibu
 - a) Keadaan Umum : baik

b) Kesadaran : Composmentis

c) Tanda-tanda vital

TD : 110/80 mmHg

RR : 18x/i

HR : 72x/i

Suhu : 36,8°C

d) Kontraksi : baik

e) Perdarahan : 100 cc

Evaluasi : keadaan dan kondisi ibu dalam keadaan baik

4. Melakukan pemeriksaan estimasi perdarahan, pengosongan kandung kemih, supaya menghindari perdarahan postpartum

Evaluasi : tidak terjadi perdarahan postpartum, keadaan ibu dalam keadaan normal

5. Mengajarkan pada keluarga untuk memasase fundus ibu dan tetap melakukan IMD serta memeriksa kontraksi uterus ibu, apabila perut ibu keras berarti kontraksi perut ibu baik, apabila perut ibu lembek berarti kontraksi perut ibu tidak baik dan segera memanggil bidan.

Evaluasi : keluarga mengerti dan bersedia memasase perut ibu dan tetap melakukan IMD serta dapat menilai kontraksi ibu

5. Memeriksa kembali kontraksi uterus dengan cara :

a. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama

b. Setiap 30 menit pada jam kedua

Tabel 3. 1 Pemantauan kala IV Persalinan

Jam ke	Waktu	TD	Nadi	Suhu	TFU	Kontraksi uterus	Kandung kemih	Perdarahan
1	16.45	110/80	70	36.5	1 Jari dibawah pusat	Keras	Kosong	±50 cc

	17.00	110/80	72		1 Jari dibawah pusat	Keras	±100 cc	±30 cc
	17.15	110/80	75		1 Jari dibawah pusat	Keras	Kosong	±30 cc
	17.30	120/80	74		1 Jari dibawah pusat	Keras	Kosong	±20 cc
2	18.00	120/80	72	36.5	1 Jari dibawah pusat	Keras	± 120 cc	±20 cc
	18.30	120/80	78		1 Jari dibawah pusat	Keras	Kosong	±10 cc
Jumlah Perdarahan								±160 cc

6. Membersihkan semua peralatan dan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, cuci alat kemudian sterilkan, cuci tangan dan memakaikan ibu pakaian yang bersih sampai ibu merasa nyaman.

Evaluasi : Semua alat telah disterilkan dan ibu telah merasa nyaman

7. Melengkapi partograf

Evaluasi : persalinan dipantau menggunakan partograf

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA
IBU NIFAS TERHADAP IBU M.S
TAHUN 2020**

I. PENGKAJIAN DATA

A. DATA SUBYEKTIF

1. Identitas

a. Identitas pasien

Nama : Ny. M.S

Umur : 26 Tahun

Agama : Kristen

Suku Bangsa : Batak/Indonesia

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Alamat : Peanornor

b. Identitas penanggung jawab

Nama : Tn. D.S

Umur : 28 Tahun

Agama : Kristen

Suku/Bangsa : Batak/Indonesia

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Alamat : Peanornor

B. ANAMNESA (DATA OBJEKTIF)

Tanggal : 26 February 2020

Alasan kunjungan saat ini : Pemeriksaan Ibu Nifas

1. Keluhan utama : Terasa mules, ada lendir yang bercampur darah

2. Keluhan lain-lain : Tidak Ada

3. Riwayat menstuarasi

a. Haid pertama : 16 tahun

b. Sikllus : 35 hari

c. Lamanya : ± 4 hari

d. Banyaknya /berapa x ganti doek atau pembalut/hari : 1-2 x ganti doek

e. Teratur/tidak teratur : teratur

f. Keluhan : tidak ada

4. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Anak ke	Tahun / umur	Usia kehamilan	Jenis persalinan	Tempat persalinan	Penolong	Komplikasi		Bayi			Nifas	
						Bayi	Ibu	PB (cm)	BB (kg)	JK	Keadaan	laktasi
1	2,3 tahun	aterm	Normal	Puskesmas	Bidan	-	-	49	3,4	P	Baik	-
2	Sekarang											

5. Riwayat kehamilan sekarang

- a. Kehamilan keberapa : G2P1A0
- b. HPHT : 18 Mei 2019 TTP : 25 February 2020
- c. UK : 39 minggu 4 hari
- d. Kujungan ANC teratur/tidak , frekuensi 7x/, tempat ANC Poskesdes
- e. Obat yang biasa dikonsumsi selama hamil : Tablet FE, Vitamin Byolysin
- f. Gerakan janin x/hari, pergerakan janin pertama kali didengar
- g. Pergerakan janin dalam 24 jam terkahir
- h. Imunisasi tetanus toxoid, Sebanyak 1x, yaitu
 TT 1 : Ya
 TT 2 : Ya
- i. Keluhan keluhan yang pernah dirasakan ibu :
 - 1) rasa lelah : TM II , TM III
 - 2) mual muntah : TM I
 - 3) nyeri perut : tidak ada
 - 4) panas menggigil : tidak ada
 - 5) penglihatan yang kabur : tidak ada
 - 6) sakit kepala yang hebat : tidak ada
 - 7) rasa nyeri / panas waktu BAK : tidak ada

- 8) rasa gatal pada vulva dan sekitarnya : tidak ada
- 9) pengeluaran cairan pervaginam : tidak ada
- 10) nyeri kemerahan, tegang pada tungkai : tidak ada
- 11) odem : tidak ada
- 12) lain-lain : tidak ada
- j. kecemasan / kekhawatiran khusus : ada
- k. tanda-tanda bahaya
 - 1) penglihatan kabur : tidak ada
 - 2) nyeri abdomen yang hebat : tidak ada
 - 3) sakit kepala yang hebat : tidak ada
 - 4) pengeluaran pervaginam : tidak ada
 - 5) odem pada wajah dan ekstremitas atas : tidak ada
 - 6) tidak terasa pergerakan janin : tidak ada
- l. tanda-tanda persalinan : tidak ada
- m. kebiasaan ibu/keluarga yang berpengaruh negatif terhadap kehamilannya : Tidak ada
- n. rencana persalinan : Ada
- 6. riwayat penyakit yang pernah diderita sekarang
 - a. penyakit jantung : tidak ada
 - b. penyakit hipertensi : tidak ada
 - c. penyakit DM : tidak ada
 - d. penyakit malaria : tidak ada
 - e. penyakit ginjal : tidak ada
 - f. penyakit asma : tidak ada
 - g. penyakit hepatitis : tidak ada
 - h. penyakit HIV/AIDS : tidak ada
 - i. riwayat operasi abdomen/ SC : tidak ada
- 7. Riwayat penyakit keluarga
 - a. penyakit jantung : tidak ada
 - b. penyakit hipertensi : ada, Ibu Pasien
 - c. penyakit TBC : tidak ada

- d. penyakit malaria : tidak ada
 - e. penyakit ginjal : tidak ada
 - f. penyakit asma : tidak ada
 - g. penyakit DM : tidak ada
 - h. penyakit hepatitis : tidak ada
 - i. Kembar : tidak ada
8. Riwayat KB
- a. KB yang pernah digunakan : tidak ada
 - b. Berapa lama : -
 - c. Keluhan : -
9. Riwayat sosial ekonomi dan psikologi
- a. Status perkawinan Sah, kawin 1 kali
 - b. Lama menikah 1 tahun, menikah pertama pada umur : 24 tahun
 - c. Kehamilan direncanakan/ tidak direncanakan :
direncanakan
 - d. Perasaan ibu dan keluarga terhadap kehamilan : senang
 - e. Pengambilan keputusan dalam keluarga : suami istri
 - f. Tempat dan petugas yang diungungkan untuk membantu persalinan: puskesmas
 - g. Tempat rujukan jika terjadi komplikasi : RS
 - h. Persiapan menjelang persalinan : ada
10. Aktivitas sehari-hari
- a. pola makan dan minum
 - 1. makan
 - frekuensi : 3 x sehari
 - porsi : 1 ½ piring
 - jenis makanan : Nasi, Lauk, Sayur, Buah,
 - pantangan : Tidak ada
 - perubahan pola makan : Tidak ada
 - 2. minum
 - jumlah : 7-9 gelas/ hari

- b. pola istirahat
 - 1. tidur siang : ½ jam
 - 2. tidur malam : 6 - 8 jam
 - 3. keluhan : tidak ada
- c. pola eliminasi
 - 1. BAK : ± 6 - 8 x/hari ,warna : kekuningan
 - 2. BAB : ± 1 x/hari, lendiri : tidak ada, warna: kecoklatan
 - Konsistensi BAB : lembek
 - Keluhan : tidak ada
- d. Personal hygiene
 - 1. Mandi : 1 x sehari
 - 2. Keramas : 2 x seminggu
 - 3. Ganti pakaian dalam : 3 x sehari
- e. Aktifitas
 - 1. Pekerjaan sehari-hari : Bertani
 - 2. Keluhan : rasa lelah, nyeri pinggang
 - 3. Hubungan seksual : tidak pernah

C. DATA OBYEKTIF

- 1. Pemeriksaan umum
 - a. Status emosional : stabil
 - b. Postur tubuh : normal
 - c. Keadaan umum : baik
 - d. Kesadaran : Compos mentis
 - e. Tanda-tanda vital :
 - 1. Suhu : 36,5⁰ C
 - 2. TD : 110/80 mmHg
 - 3. Nadi : 78x/i
 - 4. RR : 22 x/i
 - f. Pengukuran TB dan BB

1. BB sebelum hamil 62 kg, kenaikan BB selama hamil 9 kg
2. TB : 156 cm
3. LILA : 25,3 cm

2. Pemeriksaan fisik

a. Kepala

Rambut : tidak rontok warna : hitam

Kulit kepala : bersih

b. Muka

Pucat : tidak ada

Odem : tidak ada

Cloasma gravidarum : ada

c. Mata

Konjungtiva : Merah muda

Sclera : Tidak Ikterik

Odem palpebra : tidak ada

d. Hidung

Pengeluaran : tidak ada

Polip : tidak ada

e. Telinga

Simetris : Ya

Pengeluaran : tidak ada

Kelainan pendengaran : tidak ada

f. Mulut

Lidah : bersih

Bibir

Pucat/tidak : tidak ada

Pecah-pecah/tidak : Pecah-pecah

Gigi

Berlobang :Gigi atas/bawah : bawah

Gigi kanan/kiri : kiri

- | | |
|------------|-------------|
| Epulis | : Tidak ada |
| Gingivitis | : Tidak ada |
| Tonsil | : Tidak ada |
| Pharynx | : Tidak ada |
- g. Leher
- | | |
|----------------------------|-------------|
| Bekas luka operasi | : Tidak ada |
| Pemeriksaan pembuluh limfe | : Tidak ada |
- h. Dada
- | | |
|---------------|-------------------|
| Mamae | : Simetris |
| Aerola mammae | : Hiperpigmentasi |
| Puting susu | : Menonjol |
| Benjolan | : Tidak ada |
| Pengeluaran | : Tidak ada |
- i. Axila
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| Pembesaran kelenjar getah bening | : Tidak ada |
|----------------------------------|-------------|
- j. Abdomen
- | | |
|----------------------|----------------------|
| Pembesaran kehamilan | : Sesuai dengan usia |
| Linea/striae | : Nigra |
| Luka bekas operasi | : Tidak ada |
| Pergerakan janin | : 14 x/jam |
3. Pembesaran khusus
- a. Palpasi abdomen
- Leopold I : Teraba lembek, bulat tetapi melengting.
 Jika digerakkan seperti bokong, TFU : 32 cm
- Leopold II : Kanan : keras memanjang seperti punggung
 Kiri : keras terputus-putus seperti ekstremitas,
- Leopold III : Bagian terbawah janin teraba bulat keras
 melentingseperti kepala
- Leopold IV : Kepala sudah memasuki PAP (divergen)
- b. TBBJ : $(32 - 11) \times 155 = 3.225$ gram

- c. Auskultasi : 144 x/i
4. Pemeriksaan panggul luar
- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| Distansia spinarum : cm | } | Tidak Dilakukan |
| Distansia kristarum : cm | | |
| Konjugata eksterna : cm | | |
| Lingkar panggul : cm | | |
5. Pemeriksaan ketuk pinggang
- Nyeri / tidak : Tidak ada
6. Pemeriksaan ekstremitas
- Atas
- Jumlah jari tangan : Kiri dan kanan (10 jari tangan /lengkap)
- Oedem / tidak : Tidak
- Bawah
- Jumlah jari kaki : Kiri dan kanan (10 jari kaki /lengkap)
- Oedem : Tidak
- Varises : Tidak
- Refleks Patella : Aktif
7. Pemeriksaan Genetalia
- Vulva : Bersih
- Pengeluaran : ada (lendir bercampur darah)
- Kemerahan / lesi : Tidak ada
8. Pemeriksaan penunjang
- HB : 11,5 gr%
- | | | | |
|---------------|---|---|------------------------|
| Glukosa urine | } | : | Tidak Dilakukan |
| Protein urine | | | |

D. Data Penunjang

a. Riwayat Persalinan Sekarang

1. Ibu

Tempat Melahirkan : Puskesmas Onan Hasang

Penolong : Bidan

Jenis Persalinan : Spontan Pervaginam

Lama Persalinan : 9 jam 30 menit

Catatan Waktu

Kala I : 7 Jam

Kala II : 20 Menit

Kala III : 10 Menit

Kala IV : 2 jam

Ketuban Pecah : 9 jam 30 menit

Plasenta

Lahir Secara : Spontan

Berat : ± 450 Gram

Panjang Tali Pusat : 50 Cm

Perineum : Ada Laserasi Derajat II

2. Bayi

Lahir Tanggal / Pukul : 26 February 2020 / 15.55 WIB

Berat Badan : 3300 Gram

Panjang Badan : 50 Cm

Nilai APGAR : 9 / 10

Jenis Kelamin : Perempuan

Cacat Bawaan : Tidak Ada

Masa Gestasi : 39 minggu 4 hari

II. INTERPRETASI DATA

- a. Diagnosa kebidanan : P2A0 kehamilan 38-40 minggu, post partum hari pertama

Data dasar

DS :

- Ibu mengatakan bersalin tanggal 26 February 2020 jam 15.55 wib
- Ibu mengatakan masih ada keluar darah

DO :

- TD : 110/70 mmHg
- S : 36,5 °c
- RR : 24 x/ i
- N : 74 x/ i
- TFU : 2 jari dibawah pusat
- Lochea : Rubra

b. Masalah

- Nyeri pada luka jahitan

c. Kebutuhan

- Perawatan luka perineum

III. ANTISIPASI MASALAH POTENSIAL

Tidak ada

IV. TINDAKAN SEGERA

Tidak ada

V. PERENCANAAN / PLANNING

1. Jelaskan tentang kondisi ibu saat ini
2. Jelaskan pada ibu tentang kebutuhan istirahat
3. Jelaskan tanda bahaya masa nifas
4. Anjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya
5. Anjurkan agar ibu mulai untuk mobilisasi dini sendiri
6. Jelaskan pada ibu bahwa keluhan yang dialaminya adalah normal
7. Ajarkan dan lakukan perawatan luka perineum pada ibu

VI. PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI)

1. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu, keadaan umum ibu dalam keadaan baik, dengan TD: 110/70 mmHg, RR: 24 x/l, temp: 36,5°C, lochea yang keluar berwarna merah segar (Rubra), Asi sudah keluar, putting susu menonjol dan tidak lecet dan dari seluruh pemeriksaan ibu dalam keadaan normal.
2. Memberitahukan kepada ibu untuk istirahat yang cukup agar kondisi ibu tetap terjaga dengan baik dan juga istirahat saat bayi sedang tidur
3. Memberitahu kepada ibu tanda bahaya nifas yaitu :
 - a) Perdarahan lewat jalan lahir dan demam lebih dari 2 hari
 - b) Keluar cairan berbau dari jalan lahir
 - c) Bengkak diwajah, tangan atau kaki dan sakit kepala
 - d) Payudara bengkak, merah disertai rasa sakit
 - e) Ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab (depresi)
4. Memberitahu kepada ibu untuk menjaga kebersihan dirinya, dengan mandi 1-2x sehari, sikat gigi 2x sehari, dan mengganti doek setiap kali basah.
5. Menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan payudara,
 - a) Tempelkan kompres putting dengan kapas yang sudah diberikan baby oil selama 5 menit, kemudian bersihkan putting susu secara melingkar.
 - b) Tempatkan kedua tangan dipayudara kemudian diurutkan kearah atas, kesamping, kebawah melintang sehingga tangan menyanggah payudara (mengangkat payudara) kemudian lepaskan tangan dari payudara
 - c) Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri lalu licinkan kedua tangan dengan baby oil untuk melakukan pengurutan yang pertama dengan menggunakan 3 jari secara melingkar dari pangkal hingga ke putting susu secara bergantian

- d) Melakukan pengurutan dengan menggunakan telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan sisi kelingking tangan mengurut payudara ke arah putting susu gerakan sebanyak 30 kali tiap payudara
 - e) Pengurutan selanjutnya tangan dikepalkan kemudian buku-buku jari tangan mengurut payudara dari pangkal hingga ke putting susu sebanyak 30 kali secara bergantian selesai pengurutan kemudian payudara dikompres dengan waslap hangat selama 2 menit kemudian diganti dengan kompres dingin selama 1 menit secara bergantian.
 - f) Keringkan payudara dengan handuk yang bersih dan memasang bra yang menyokong payudara ibu
Evaluasi : Ibu bersedia untuk melakukan perawatan payudara
 - g) Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini seperti miring kanan dan kiri yang berguna untuk melancarkan pengeluaran lochea, mengurangi infeksi puerperium, mempercepat involusi alat kandungan, melancarkan fungsi alat perkemihan, meningkatkan peredaran darah sehingga mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sisa metabolisme
6. Memeriksa pengeluaran lochea ibu yaitu pengeluaran lochea normal pada hari pertama sampai hari ketiga yaitu lochea rubra berwarna kemerahan
7. Menjelaskan pada ibu tentang perawatan luka perineum yaitu
- a) Untuk membersihkan vagina dan bagian perineum setelah buang air, gunakan air hangat.
 - b) Keringkan area vagina dan perineum menggunakan tisu atau kain yang bersih.
 - c) Ganti pembalut setiap 4-6 jam.
 - d) Biarkan perineum dan vagina sembuh dengan sendirinya. Artinya, jangan terlalu sering mengecek dan menyentuhnya.

- e) Jangan takut untuk BAB karena jahitannya tidak akan robek. Namun untuk memudahkan dan melancarkan BAB, minumlah banyak cairan dan konsumsilah buah dan sayuran segar.

VII. EVALUASI

1. Ibu mengerti keadaannya saat ini dalam keadaan baik
2. Ibu telah mengerti kebutuhan istirahat
3. Ibu telah mengerti tanda bahaya masa nifas
4. Ibu bersedia menjaga kebersihan dirinya
5. Ibu telah mengerti dan bersedia untuk mobilisasi dini
6. Ibu mengerti bahwa keluhan yang dialaminya adalah normal
7. Telah dilakukan perawatan luka pada perineum ibu, dan ibu mengerti cara perawatan perineum yang telah diajarkan.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA
BAYI BARU LAHIR IBU M.S
TAHUN 2020**

Tanggal pengkajian : 27 February 2020
Waktu pengkajian : 14.30 WIB
Pengkaji : Chrisnina Sembiring

I. PENGKAJIAN DATA

A. DATA SUBYEKTIF

a. Data Subjektif (S)

Nama bayi : Butet Sitompul
Umur bayi : 1 hari
Tanggal/jam lahir : 27 February 2020/ 16.15 Wib
Jenis kelamin : Perempuan
Anak ke : 2
Alamat : Peanornor, Pahae Julu

b. Data Objektif (O)

1. Tindakan yang pernah diberikan
 - a) Resusitasi : tidak ada
 - b) Hisapan lendir : tidak ada
 - c) Masase jantung : tidak ada
 - a. Intubasi indotracheal : tidak ada
 - b. O₂ : tidak ada
 - c. DII : tidak ada
2. Pemeriksaan umum
 - a) Pernapasan : 46x/i
 - b) Denyut nadi : 128x/i
 - c) Suhu : 36,8°C
 - d) BB lahir : 3300 gram
 - e) Panjang Badan : 50 cm

f) Lingkar Dada : 35 cm

g) Lingkar Kepala : 33 cm

3. Pemeriksaan Fisik Secara Sistematis

a) Kepala

Rambut : warna hitam

b) Mata

Oedema : tidak ada

Conjungtiva : merah muda

Sklera : putih/ tidak ikhterik

c) Hidung : normal

Pengeluaran : tidak ada

d) Mulut : Normal

e) Gigi : belum ada

f) Telinga : Normal

g) Leher : tidak ada pembengkakan

h) Dada : Normal

i) Tali pusat : belum puput

j) Punggung : keras

k) Ekstremitas : lengkap 5/5

l) Genitalia : ada

m) Anus : berlobang

n) Refleks

Refleks Moro : aktif

Refleks Rooting : aktif

Refleks Sucking : aktif

Refleks Plantar : aktif

Refleks baby skin : aktif

Refleks Palmer : aktif

Refleks tonick neck : aktif

o) Eliminasi

BAK : sudah ada

Mekonium : sudah ada

p) Nilai Apgar SCORE :

Tabel 3. 2 Penilaian APGAR SCORE

Gejala	1 menit	5 menit	10 menit
Denyut Jantung (pulse)	2	2	2
Pernapasan (Respiration)	1	2	2
Tonus Otot (Activity)	1	2	2
Kepekaan refleks (gremace)	1	1	1
Warna (apperence)	2	2	2
Jumlah	7	8	9

II. INTERPRETASI DATA

a. Diagnosa Kebidanan : Neonatus dengan usia 1 hari lahir dengan spontan

Data dasar

DS :

- Ibu mengatakan bersalin tanggal 26 February 2020 jam 15.55 wib
- Ibu mengatakan masih ada keluar darah

DO :

BB : 3300 gram HR : 128x/i

PB : 50 cm RR : 46x/i

Refleks :

Refleks Moro : aktif Refleks Sucking : aktif

Refleks Rooting : aktif Refleks tonic neck :aktif

Keadaan umum bayi : baik

b. Masalah : Tidak Ada

c. Kebutuhan : Tidak ada

III. ANTISIPASI MASALAH POTENSIAL

Tidak ada

IV. TINDAKAN SEGERA

Tidak ada

V. PERENCANAAN / PLANNING

1. Jelaskan tentang kondisi Bayi saat ini
2. Lakukan perawatan tali pusat terhadap bayi
3. Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan bayi dengan mengganti popok bayi
4. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayi
5. Anjurkan agar ibu menyendawakan bayi setelah bayi selesai minum
6. Beritahu manfaat kebutuhan ASI terhadap Ibu dan Bayi
7. Beritahu kepada ibu teknik menyusui yang benar
8. Beritahu kepada ibu tanda dan bahaya pada Bayi baru lahir
9. Ingatkan ibu untuk tetap menjaga kehangatan Bayi
10. Bawa bayi kepetugas kesehatan bila ada keluhan lain

VI. PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI)

1. Melakukan pemeriksaan terhadap bayi dan memberitahukan hasil
2. Melakukan perawatan tali pusat terhadap bayi dimana disaat kassa basah atau kotor, ibu dan keluarga dianjurkan untuk segera menggantinya tanpa menambahkan apapun pada kassa tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi
3. Menganjurkan ibu untuk merawat kebersihan bayi dengan mengganti pakaian atau popok bayi setelah BAK dan BAB.

4. Mengajarkan ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi dimana bayi sampai berumur 6 bulan hanya mendapatkan ASI tanpa makanan tambahan pada bayi dan memberikan ASI setiap saat dimana bayi membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.
5. Mengajarkan ibu untuk menyendawakan bayi pada saat selesai diberikan ASI yaitu dengan cara : mengendong bayi tegak lurus, sandarkan pada bahu lalu tepuk-tepuk halus punggung bayi hingga bayi sendawa
6. Memberitahukan kepada ibu manfaat pemberian ASI, yaitu :
 - a. Meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi
 - b. Sehat, praktis dan tidak butuh biaya
 - c. Mencegah perdarahan pada ibu nifas
 - d. Menjalin kasih sayang ibu dan bayi
 - e. Mencegah kanker payudara
7. Mengajarkan kepada ibu cara/teknik menyusui yang benar, yaitu : ibu duduk dikursi yang ada sandarannya, membuat penyangga dikaki ibu, bayi digendong menghadap perut ibu, merangsang hisapan bayi dengan meletakkan ujung jari kelingking ditepi bibir bayi, memasukkan seluruh aerola hingga puting susu ibu ke dalam mulut bayi dan menyusukan bayi dengan payudara diberikan secara bergantian
8. Memberitahu kepada ibu tanda bahaya bayi baru lahir, seperti :
 - a. Tidak mau menyusu
 - b. Kejang-kejang, diare, kulit dan mata bayi kuning
 - c. Lemah, sesak nafas, demam/panas tinggi dan mata bayi bernanah
 - d. Bayi merintih atau menangis terus menerus
 - e. Tali pusar kemerahan sampai dinding perut, berbau atau bernanah
 - f. Tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat
9. Memberitahukan kepada ibu agar mencegah kehilangan panas bayi dimana dapat kehilangan panas melalui : air mandi bayi yang terlalu dingin, bayi yang diletakkan dekat dinding, bayi berada pada ruangan dingin

atau jendela terbuka, bayi basah (BAK/BAB) tidak langsung diganti dan bayi yang dekat dengan kipas angin atau AC.

10. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk menelfon atau membawa bayi ke petugas kesehatan jika bayi mengalami keluhan atau masalah

V. EVALUASI

1. Telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya telah diberitahukan kepada keluarga bahwa bayi dalam keadaan yang baik
2. Telah dilakukan perawatan tali pusat
3. Ibu bersedia menjaga kebersihan bayi
4. Ibu telah bersedia untuk memberikan ASI eksklusif
5. Ibu telah bersedia untuk menyendawakan bayi
6. Ibu telah memahami manfaat pemberian ASI
7. Ibu telah mengerti cara/ teknik menyusui yang benar
8. Ibu telah mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir
9. Ibu telah memahami cara mencegah kehilangan panas bayi
10. Ibu bersedia membawa bayi ke petugas kesehatan jika ada masalah

LAPORAN PERSALINAN

Pada hari tanggal 26 Februari 2020 pukul 08:00 WIB, Ibu M.S umur 26 tahun G2P1A0 hamil 38-40 minggu ibu datang ke Puskesmas Onan Hasang, Pahae Julu dengan keluhan keluar lendir bercampur darah dari kemaluan ibu, pinggang terasa panas dan pegal mulai dari perut ke punggung, perut terasa mules mulai pukul 05.00 WIB. Dengan hasil pemeriksaan bidan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 72 x/l, denyut jantung janin 142 x/l, kontraksi 3x dalam 10 menit durasi 45 detik, pembukaan 3 cm, penurunan ada di hodge II. Pada pukul 15.35 WIB pembukaan lengkap penurunan kepala 0/5, air ketuban sudah pecah dan jernih, dimasukkan cairan RL.

Pada pukul 15.55 WIB bayi lahir segera menangis, dilakukan manajemen aktif kala III, peregangan tali pusat terkendali lamanya 15 menit dilakukan oksitosin 10 ui setelah bayi baru lahir, plasenta lahir dengan lengkap, tidak ada ditemukan tanda bahaya. Pada pukul 15:55 WIB bayi baru lahir dengan berat badan 3300 gram, panjang badan 50 cm, jenis kelamin: Perempuan dan ada robekan jalan lahir tingkat 2 di perineum.

Setelah persalinan selesai dilakukan pemantauan kala IV mulai dari pemantauan 15 menit selama 2 jam pertama. Pada pukul 16.45 WIB dengan hasil tekanan darah 110/80 mmHg, tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih sudah di kosongkan. 17:00 WIB dengan hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, kontraksi baik, kandung kemih ± 100 cc, pada pukul 17.15 WIB tekanan darah 110/80 mmHg, pada pukul 17:30 WIB tekanan darah 120/80 mmHg, pukul 18.00 tekanan darah 120/80, kontraksi baik, kandung kemih ± 120 cc dan pukul 18:30 hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus dalam keadaan baik, tidak ditemukan masalah di pemantauan kala IV dengan keadaan ibu dan bayi dalam keadaan baik.

Diketahui

Pembimbing lapangan

Penolong persalinan

Bidan Rolasta Hutagaol, Amd.Keb

Chrisnina br Sembiring

NIP: 19741009 200701 2 002

NPM. 171603

Pembimbing Akademik

Dimpu R Nainggolan ,SST, M.Kes

NIP: 19781025 201101 2 003

DOKUMENTASI

PEMERIKSAAN TINGGI BADAN



PEMERIKSAAN TD



PEMERIKSAAN LILA



PEMERIKSAAN DJJ



PEMERIKSAAN Hb



PEMERIKSAAN URINE



KONSELING (dokumentasi dikunjungi III)



DOKUMENTASI PERSALINAN

PENGELUARAN BAYI



PENJEPITAN TALI PUSAT



PENGGUNTINGAN TALI PUSAT



PENYUNTIKAN OKSITOSIN



PENGELUARAN PLASENTA



PENILAIAN PLASENTA



LASERASI JALAN LAHIR



**DOKUMENTASI BAYI BARU LAHIR
PENYUNTIKAN VIT-K DAN HB-0**



MEMANDIKAN BAYI



MERAWAT TALI PUSAT



MENGENAKAN GURITA BAYI



MENGENAKAN PAKAIAN BAYI



DOKUMENTASI NIFAS
PEMERIKSAAN TANDA-TANDA VITAL



PEMERIKSAAN TFU

